

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI DOBRO DOŠLI U „ZELENU PROGNOZU“

DANAS VAS INFORMIŠEMO O KUPUSNOJ MUVI, VAŽNOJ ŠTETOČINI U PROIZVODNJI RANIH KUPUSNJAČA

FENOFAZE KUPUSA

NA PODRUČJU VOJVODINE MANJI DEO POVRŠINA POD RANIM KUPUSNJAČAMA JE RASAĐEN DOK SE U NAREDNOM PERIODU OČEKUJE RASAĐIVANJE PREOSTALIH POVRŠINA.

KUPUSNA MUVA (*Delia radicum*)

VEOMA ZNAČAJNA ŠTETOČINA U PROIZVODNJI RANIH KUPUSNJAČA JE KUPUSNA MUVA. ODRASLE JEDINKE MUVA POJAVLJUJU SE RANO NA PROLEĆE I POLAŽU JAJA NA KORENOV VRAT KUPUSA ILI U ZEMLJU NEPOSREDNO OKO TEK RASAĐENIH BILJAKA. ISPIJENE LARVE SE U POČETKU HRANE KORENOVIM DLAČICAMA, A KASNIJE PRODIRU U KOREN KUPUSA I OMETAJU NORMALNO CIRKULISANJE SOKOVA. NAPADNUTE BILJKE MENJAJU BOJU I POSTAJU PLAVOLJUBIČASTE, A KADA JE NAPAD VEĆI POSTAJU BLEDE I SUŠE SE. MLADE BILJKE MOGU BITI UNIŠTENE OD SAMO JEDNE LARVE.



SLIKA 1. JAJA KUPUSNE MUVE



SLIKA 2. LARVE KUPUSNE MUVE NA KORENU



SLIKA 3. SUŠENJE BILJKE KUPUSA USLED ISHRANE LARVI KUPUSNE MUVE NA KORENU



SLIKA 4. NAPADNUTA I ZDRAVA BILJKA KUPUSA

NA FEROMONSKIM KLOPKAMA REGISTRUJE SE ULOV ODRASLIH JEDINKI KUPUSNE MUVE. U TOKU JE LET ODRASLIH JEDINKI PRVE GENERACIJE OVE ŠTETOČINE.



SLIKA 5. ODRASLA JEDINKA KUPUSNE MUVE NA FEROMONSKOJ KLOPCI



SLIKA 6. ODRASLA JEDINKA KUPUSNE MUVE

PREPORUKA

S OBZIROM DA JE U TOKU LET KUPUSNE MUVE, U USEVIMA KUPUSNJAČA, ODMAH PO RASAĐIVANJU, PREPORUČUJE SE PRIMENA INSEKTICIDA U CILJU SUZBIJANJA IMAGA I SPREČAVANJA POLAGANJA JAJA. PREPORUČUJE SE PRIMENA NEKOG OD SLEDEĆIH PREPARATA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA
BIFENICUS, FOBOS-EC	BIFENTRIN	0,2-0,3 L/HA

PRILIKOM PRIMENE PESTICIDA TREBA SE PRIDRŽAVATI UPUTSTVA ZA UPOTREBU I PREDUZETI SVE MERE U CILJU ZAŠTITE OPRAŠIVAČA.

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI, DETALJNIJE INFORMACIJE O POJAVI ŠTETNIH ORGANIZAMA I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI NA SAJTU PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE WWW.PISVOJVODINA.COM