

## Zelena prognoza za 1.8.2018. - O stanju u zasadima jabuka

### FAZE JABUKA

NA PODRUČJU VOJVODINE, U ZAVISNOSTI OD SORTIMENTA, JABUKE SE NALAZE U RAZLIČITIM FAZAMA SAZREVANJA PLODOVA.



SLIKA 1. FAZA RAZVOJA JABUKA

### **JABUKIN SMOTAVAC (*Carpocapsa pomonella*)**


JABUKIN SMOTAVAC JE NAJZNAČAJNIJA ŠTETOČINA JABUKE. U NAŠIM PROIZVODNIM USLOVIMA RAZVIJA DVE DO TRI GENERACIJE GODIŠNJE.

ŠTETE PRIČINJAVAJU LARVE KOJE SE UBUŠUJU U PLODOVE I ISHRANJUJU MESOM PLODA I SEMENKAMA. NAPADNUTI PLODOVI PREVREMENO OTPADAJU I GUBE TRŽIŠNU VREDNOST.

U ZASADIMA JABUKA NA PODRUČJU VOJVODINE U TOKU JE PILJENJE LARVI TREĆE GENERACIJE JABUKINOG SMOTAVCA. U VIZUELNIM PREGLEDIMA PLODOVA JABUKA REGISTRUJE SE PRISUSTVO SVIH RAZVOJNIH STADIJUMA JAJA I TEK ISPIJENIH LARVI OVE ŠTETOČINE.



SLIKA 2. JAJE JABUKINOG SMOTAVCA PRED PILJENJE



SLIKA 3. LARVA JABUKINOG SMOTAVCA NA PLODU

## **PREPORUKA**

U CILJU SPREČAVANJA UBUŠIVANJA LARVI U PLODOVE PREPORUČUJE SE PRIMENA INSEKTICIDA:

<b>PREPARAT</b>	<b>AKTIVNA MATERIJA</b>	<b>DOZA/KONCENTRACIJA</b>
AFFIRM 095 SC	EMAMEKTIN	0,25-0,3%

KARENCA ZA NAVEDENI INSEKTICID IZNOSI 7 DANA.