

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI DOBRO DOŠLI U „ZELENU PROGNOZU“

DANAS VAS INFORMIŠEMO O PREVENTIVNIM MERAMA KONTROLE ŠTETNIH ORGANIZAMA U PROIZVODNJI RASADA POVRĆA

FAZE RASADA POVRĆA

NA PODRUČJU VOJVODINE U TOKU JE PROIZVODNJA RASADA PARADAJZA, KRSTAVACA, PAPRIKE, KUPUSNJAČA I DRUGOG POVRĆA.



SLIKA 1. RASAD PAPRIKE



SLIKA 2. RASAD POVRĆA U PLASTENIKU



SLIKA 3. RASAD KUPUSA

U PERIODU PROIZVODNJE RASADA U ZATVORENOM PROSTORU, VEOMA VAŽNO JE REDOVNO SPROVOĐENJE PREVENTIVNIH MERA KONTROLE ŠTETNIH ORGANIZAMA KAKO BI NA OTVORENO POLJE BILE IZNETE ZDRAVE BILJKE U DOBROJ KONDICIJI.

PROŠLE GODINE JE LABORATORIJSKI POTVRĐENO PRISUSTVO VIRUSA MOZAIKA KRSTAVCA, VIRUSA BRONZAVOSTI PARADAJZA I VIRUSA CRTIČASTOG MOZAIKA KROMPIRA U PROIZVODNIM USEVIMA PAPRIKE, PARADAJZA, KRSTAVACA I DRUGOG POVRĆA. **VIROZE** SU VEĆ DUGO VELIKI PROBLEM U PROIZVODNJI POVRĆA NA NAŠIM PROSTORIMA, KAKO U ZATVORENOM PROSTORU, TAKO I NA OTVORENOM POLJU. JEDAN OD KLJUČNIH RAZLOGA ZAŠTO JE TO TAKO JE I ČINJENICA DA U KONTROLI VIROZA NE POSTOJI DIREKTNA MERA SUZBIJANJA TJ. NEMA LEKA U SUZBIJANJU VIRUSA I NA RASPOLAGANJU SU SAMO PREVENTIVNE MERE BORBE KOJE TREBA REDOVNO DA SE SPROVODE TOKOM ČITAVOG PERIODA VEGETACIJE. ZBOG TOGA ŽELIMO U OVIM, POČETNIM FAZAMA RAZVOJA POVRĆA, DA ISTAKNEMO ZNAČAJ I NEOPHODNOST SPROVOĐENJA PREVENTIVNIH MERA JER JE TO JEDINI NAČIN DA SE POSTIGNU VISOKI PRINOSI I DOBAR KVALITET PROIZVODA.



SLIKA 4. SIMPTOMI VIROZA NA POVRĆU



SLIKA 5. LISNE VAŠI NA LISTU PAPRIKE



SLIKA 6. TRIPSI U CVETU PAPRIKE

PREPORUKA

MERE KOJE SADA MOGU DA SE SPROVODE SU:

- SUZBIJANJE KOROVA U I OKO PLASTENIKA U KOME SE PROIZVODI RASAD JER SU KOROV I NAJZNAČAJNIJI IZVOR ZARAŽENOSTI U TEKUĆOJ VEGETACIJI,
- POSTAVLJANJE INSEKATSKIH MREŽA NA ULAZNE OTVORE PLASTENIKA U CILJU SPREČAVANJA ULAZAKA INSEKATA U PLASTENIK, POPUT VAŠI I TRIPSA KOJI SU PRENOSIOCI VIRUSA,
- BILJKE SA SIMPTOMIMA VIROZA TREBA UKLONITI IZ RASADA I UNIŠTITI VAN MESTA PROIZVODNJE,
- POSTAVLJANJE ŽUTIH LEPLJIVIH TRAKA ZA PRAVOVREMENU UTVRĐIVANJE PRISUSTVA VAŠI I TRIPSA KAO VEKTORA VIRUSA,
- TREBA REDOVNO VRŠITI PREGLED RASADA NA PRISUSTVO VAŠI I TRIPSA I UKOLIKO SE REGISTRUJE NJIHOVO PRISUSTVO PRIMENI HEMIJSKIH MERA ZAŠTITE REGISTRIVANIM INSEKTICIDIMA. VAŠI TREBA TRAŽITI NA NALIČJU LISTA DOK SE PRISUSTVO TRIPSA NAJLAKŠE MOŽE UTVRĐITI OTRESANJEM BILJAKA NA BELU PODLOGU.



SLIKA 7. KOROV U PLASTENIKU



SLIKA 8. ODRŽAVANJE HIGIJENE OKO PLASTENIKA

NAJZNAČAJNIJA **FITOPATOGENA GLJIVA** U PROIZVODNJI RASADA JE PROUROKOVAČ POLEGANJA RASADA. DO ZARAZE DOLAZI PREKO KORENA ILI STABLA ISPOD POVRŠINE ZEMLJIŠTA. ZARAŽENO TKIVO POSTAJE VODENASTO I OBEZBOJENO I ZAHVAĆENI DEO STABLA POSTAJE TANJI U ODNOSU NA ZDRAV, PRI ČEMU DOLAZI DO POLEGANJA BILJAKA. PRILIKOM JAČIH ZARAZA POLEGLE BILJKE VRLO BRZO ISTRUNU I IZGLEDAJU KAO ISTOPLJENE, PA SE OVA BOLEST JOŠ NAZIVA I „TOPLJENJE RASADA“.



SLIKA 9. SIMPTOM *Pythium* spp.



SLIKA 10. SIMPTOM *Pythium* spp.

PREPORUKA

SA CILJEM KONTROLE POLEGANJA RASADA PREPORUČUJU SE SLEDEĆE PREVENTIVNE MERE:

- HEMIJSKA ZAŠTITA RASADA ZALIVANJEM RASTVOROM FUNGICIDA U KONTEJNERIMA ILI LEJAMA ODMAH POSLE SETVE ILI PIKIRANJA RASADA I 10-14 DANA KASNIJE,
- ZA ZALIVANJE RASADA SE PREPORUČUJU FUNGICIDI NA BAZI AKTIVNE MATERIJE PROPAMOKARB-HIDROHLORID,

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJAI	DOZA
PROPLANT 722-SL	PROPAMOKARB-HIDROHLORID	0,15%
RIVAL 607 - SL		0,15%
PREVICUR ENERGY	PROPAMOKARB-HIDROHLORID + FOSETIL-ALUMINIJUM	3-6 ML U 2L VODE PO M ²

- ODRŽAVANJE OPTIMALNOG OSVETLJENJA, TEMPERATURE, RELATIVNE VLAŽNOSTI VAZDUHA I ADEKVATNO PROVETRAVANJE RASADNIKA KAKO BI SE OMOGUĆIO NEOMETAN RAST I RAZVOJ BILJAKA I,
- UKOLIKO DOĐE DO POLEGANJA RASADA TREBA ODSTRANITI OBOLELE BILJKE I UNIŠTITI IH VAN MESTA PROIZVODNJE.

.....
POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I POŠTOVANI GLEDAOCI, DETALJNIJE INFORMACIJE O POJAVI ŠTETNIH ORGANIZAMA I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI NA SAJTU PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE
WWW.PISVOJVODINA.COM