

## Zelena prognoza za 2.5.2019. - O STANJU U USEVIMA KUPUSNJAČA

### FAZE KUPUSA

NA PODRUČJU VOJVODINE USEVI RANIH KUPUSNJAČA SE NALAZE U FAZI RAZVOJA LISTOVA.

### **KUPUSOV MOLJAC (*Plutella maculipennis*)**

KUPUSOV MOLJAC JE VEOMA ZNAČAJNA ŠTETOČINA KUPUSNJAČA NA NAŠEM PROIZVODNOM PODRUČJU.

TOKOM JEDNE GODINE U NAŠIM USLOVIMA RAZVIJA SEDAM DO OSAM GENERACIJA. ŠTETE PRIČINJAVAJU GUSENICE KOJE SE HRANE LISTOVIMA KUPUSNJAČA, A U KASNIJIM FAZAMA RAZVOJA UBUŠUJU SE U GLAVICU. PRI JAČEM NAPADU DOLAZI DO GOLOBRSTA KADA OSTAJU SAMO GLAVNI NERVI NA LISTOVIMA.

VIZUELNIM PREGLEDIMA USEVA KUPUSA REGISTROVANO JE PRISUSTVO JAJA I GUSENICA KUPUSOVOG MOLJCA NA NALIČJU LISTOVA. U TOKU JE PILJENJE GUSENICA PRVE GENERACIJE KUPUSOVOG MOLJCA.



SLIKA 1. JAJA KUPUSOVOG MOLJCA NA NALIČJU LISTA KUPUSA



SLIKA 2. GUSENICA KUPUSOVOG MOLJCA NA NALIČJU LISTA KUPUSA



SLIKA 3. GUSENICA KUPUSOVOG MOLJCA NA NALIČJU LISTA KUPUSA

## PREPORUKA

PROIZVOĐAČIMA KUPUSNJAČA SE PREPORUČUJE PREGLED USEVA NA PRISUSTVO GUSENICA KUPUSOVOG MOLJCA. UKOLIKO SE REGISTRUJE NJIHOVO PRISUSTVO PREPORUČUJE SE PRIMENA SLEDEĆEG INSEKTICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA
CIPKORD 20 EC	CIPERMETRIN	0,15-0,3 L/HA