

O STANJU U ZASADIMA VINOVE LOZE

FENOFAZE VINOVE LOZE

NA PODRUČJU VOJVODINE VINOVA LOZA SE NALAZI U RAZLIČITIM FAZAMA CVETANJA.



SLIKA1-FAZA RAZVOJA VINOVE LOZE, SORTA CRNI BURGUNDAC

PLAMENJAČA VINOVE LOZE (*Plasmopara viticola*)

U PRETHODNIM EMISIJAMA OBAVEŠTAVALI SMO VAS O POVOLJNIM USLOVIMA ZA RAZVOJ GLJIVE KOJA PROUZROKUJE PLAMENJAČU VINOVE LOZE, A PRE DESET DANA I O POJAVI SIMPTOMA OVOG PATOGENA U VINOGRADIMA NA CELOM PODRUČJU VOJVODINE. OD TADA, REGISTRUJE SE POVEĆANJE SIMPTOMA NA LISTOVIMA VINOVE LOZE KOJI SU POSLEDICA SEKUNDARNIH INFEKCIJA PROUZROKOVAČEM PLAMENJAČE. USLOVI ZA ŠIRENJE PLAMENJAČE VINOVE LOZE SU I DALJE POVOLJNI I UKOLIKO DOĐE DO INFEKCIJE CVETA, CEO PRINOS MOŽE BITI UGROŽEN.



SLIKA2-SIMPTOMI PLAMENJAČE NA LISTU

PREPORUKA

ZBOG VEOMA KRITIČNE SITUACIJE U KOJOJ SE TRENUTNO NALAZIMO, A TO JE PRISUSTVO PATOGENA U ZASADIMA, POVOLJNI USLOVI ZA DALJE ŠIRENJE PLAMENJAČE I OSETLJIVA FAZA VINOVE LOZE, NEOPHODNO JE IZVRŠITI HEMIJSKU ZAŠTITU VINOGRADA SA NEKIM OD SLEDEĆIH FUNGICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJ	KONCENTRACIJA/DOZA
MIKAL FLASH	FOSETIL-ALUMINIJUM+FOLPET	0,3-0,4%
RIDOMIL GOLD MZ 68-WG	MANKOZEB+METALAKSIL-M	2,5 KG/HA
PROFILER	FOSETIL-ALUMINIJUM+FLUOPIKOLID	2,25-3 KG/HA
VERITA	FOSETIL-ALUMINIJUM+FENAMIDON	0,25-0,3%

PEPELNICA VINOVE LOZE (*Uncinula necator*)

PEPELNICA VINOVE LOZE JAVLJA SE REDOVNO U NAŠIM VINOGRADARSKIM REGIJAMA. NAPADA SVE ZELJASTE DELOVE VINOVE LOZE, LIŠĆE, LASTARE, CVETOVE I GROZDOVE.

U USLOVIMA POVOLJNIM ZA NJEN RAZVOJ MOŽE BITI VEOMA ŠTETNO
OBOLJENJE I VODI KA SMANJENJU PRINOSA.
NA OSETLJIVIM SORTAMA POPUT FRANKOVKE MOGU SE UOČITI SIMPTOMI
PEPELNICE NA LISTU, A NA NALIČJU LISTA NALAZI SE BELIČASTA NAVLAKA
OD SPORONOSNIH ORGANA GLJIVE.



SLIKA3-SIMPTOMI PEPELNICE NA LICU LISTA VINOVE LOZE



SLIKA4-SIMPTOMI PEPELNICE NA NALIČJU LISTA VINOVE LOZE

USLOVI KOJI TRENUTNO VLADAJU SU VEOMA POVOLJNI ZA RAZVOJ PEPELNICE. SUZBIJANJE OVOG PATOGENA U PERIODU CVETANJA JE VEOMA BITNO ZA OČUVANJE RODA.

PREPORUKA

ZA SUZBIJANJE PEPELNICE VINOVE LOZE, PREPORUČUJE SE PRIMENA NEKOG OD REGISTROVANIH FUNGICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJIA	DOZA/KONCENTRACIJA
FALCON EC-460	TEBUKONAZOL+TRIADIMENOL +SPIROKSAMIN	0,4 L/HA
POSTALON 90 SC	MIKLOBUTANIL+KVINOKSIFEN	1,25 L/HA
TOPAS 100 EC	PENKONAZOL	0,04%