

O STANJU U ZASADIMA JABUKA

FENOFAZE JABUKA

NA PODRUČJU VOJVODINE ZASADI JABUKA SE U ZAVISNOSTI OD SORTIMENTA NALAZE U RAZLIČITIM FAZAMA CVETANJA.



SLIKA 1. FAZA JABUKE

ČAĐAVA PEGAVOST LISTA I KRSTAVOST PLODOVA JABUKE (*Venturia inaequalis*)

PROUZROKOVAČ ČAĐAVE PEGAVOSTI LISTA I KRSTAVOSTI PLODOVA JABUKE JE NAJZNAČAJNIJI PATOGEN U PROIZVODNJI JABUKA. JAVLJA SE SVAKE GODINE U SVAKOM JABUČNJAKU.

U OVONEDELJNOJ LABORATORIJSKOJ ANALIZI PREZIMELOG LIŠĆA JABUKE KONSTATOVANI SU VISOKI PROCENTI DOZRELOSTI PSEUDOTECIJA OVE GLJIVE KOJI SE KREĆU I DO 30%.



SLIKA 2. ASKOSPORE *Venturia inaequalis*

OVAKVI PROCENTI DOZRELOSTI PSEUDOTECIJA UKAZUJU NA SPOSOBNOST GLJIVE DA U USLOVIMA PADAVINA OSLOBAĐA VELIKI BROJ ASKOSPORA.

UZIMAJUĆI U OBZIR BIOLOGIJU OVOG PATOGENA I NAJAVLJENE PADAVINE, U NAREDNIH NEKOLIKO DANA PROGNOZIRA SE INTENZIVNO OSLOBAĐANJE ASKOSPORA I VISOK RIZIK OD INFEKCIJA OVOG PATOGENA.

DANI KOJI SU PRED NAMA SU KRITIČNI U ZAŠTITI JABUKE OD PROUZROKOVAČA ČAĐAVE PEGAVOSTI LISTA I KRSTAVOSTI PLODOVA JABUKE.

PREPORUKA

JABUKE SE NALAZE U IZUZETNO OSETLJIVOJ FAZI RAZVOJA, U FAZI CVETANJA, KADA SE NE SME DOZVOLITI OSTVARENJE PRIMARNIH INFEKCIJA. U ZASADIMA JABUKA PREPORUČUJE SE PRIMENA KOMBINACIJE PREVENTIVNOG I SISTEMIČNOG FUNGICIDA KAKO BI SE OBEZBEDILA ZAŠTITA U PREDSTOJEĆIM DANIMA KADA SE NAJAVLJUJE NESTABILNO VREME SA PADAVINAMA.

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	KONCENTRACIJA
MANKOGAL-80 ILI DITHANE M-45 +	MANKOZEB +	0,25% +
CHORUS 50-WG ILI CIPRODEX	CIPRODINIL	0,05%

PEPELNICA JABUKE (*Podosphaera leucotricha*)

U ZASADIMA JABUKA REGISTRUJE SE PRISUSTVO SIMPTOMA PEPELNICE U VIDU BELIH MLADARA. USLOVI U KOJIMA SE NALAZIMO SU VEOMA POVOLJNI ZA DALJI RAZVOJ OVOG PATOGENA, A TO SU RELATIVNA VLAŽNOST VAZDUHA VIŠA OD 60% I TEMPERATURE OD 15 DO 25°C.



SLIKA 3. SIMPTOMI PEPELNICE JABUKE – BELI MLADAR

PREPORUKA

U ZASADIMA GDE SE REGISTRUJE PRISUSTVO BELIH MLADARA PREPORUČUJE SE NJIHOVO MEHANIČKO UKLANJANJE. KOD SORATA OSETLJIVIH NA PEPELNICU JABUKE KAO ŠTO SU

AJDARED, JONAGOLD, RED JONAPRINS I DRUGE, PREPORUČUJE SE PRIMENA SLEDEĆEG FUNGICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA/KONCENTRACIJA
KARATHANE GOLD 350 EC	MEPTILDINOKAP	0,4-0,5 L/HA