

Zelena prognoza za 3.5.2018. - O stanju u zasadima vinove loze

FENOFAZE VINOVE LOZE

NA PODRUČJU VOJVODINE VINOVA LOZA SE NALAZI U FENOFAZAMA PRED CVETANJE, OD FAZE CVAŠTI JASNO VIDLJIVE DO FAZE CVAŠTI POTPUNO RAZVIJENE, CVETOVI ODVOJENI.



SLIKA 1. FAZA RAZVOJA VINOVE LOZE

PLAMENJAČA VINOVE LOZE (*Plasmopara viticola*)

PLAMENJAČA VINOVE LOZE JE VEOMA VAŽNO OBOLJENJE U NAŠIM PROIZVODNIM USLOVIMA I U GODINAMA POVOLJNIM ZA NJEN RAZVOJ MOŽE DA NANESE VELIKE ŠTETE U PROIZVODNJI GROŽĐA. UKOLIKO DOĐE DO INFEKCIJE CVETA, CEO PRINOS MOŽE BITI UGROŽEN.

NA PODRUČJU VOJVODINE, U PROTEKLOM PERIODU ISPUNJENI SU USLOVI ZA OSTVARENJE PRIMARNIH ZARAŽENOSTI OD PROUZROKOVAČA PLAMENJAČE VINOVE LOZE. SA NAREDNIM PADAVINAMA MOŽE SE OČEKIVATI NOVI CIKLUS INFEKCIJA I ŠIRENJE ZARAŽENOSTI.



SLIKA 2. PLAMENJAČA NA GROZDU (SIMPTOM IZ 2016. GODINE)

PREPORUKA

ZBOG POVOLJNOSTI USLOVA ZA RAZVOJ PLAMENJAČE I ULASKA VINOVE LOZE U VEOMA OSETLJIVU FAZU RAZVOJA-FAZU CVETANJA, PREPORUČUJE SE PRIMENA SLEDEĆEG FUNGICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	KONCENTRACIJA/DOZA
MIKAL FLASH	FOSETIL-ALUMINIJUM+FOLPET	0,3-0,4%

PEPELNICA VINOVE LOZE (*Uncinula necator*)

PEPELNICA VINOVE LOZE JAVLJA SE REDOVNO U NAŠIM VINOGRADARSKIM REGIJAMA. NAPADA SVE ZELJASTE DELOVE VINOVE LOZE, LIŠĆE, LASTARE, CVETOVE I GROZDOVE. U USLOVIMA POVOLJNIM ZA NJEN RAZVOJ MOŽE BITI VEOMA ŠTETNO OBOLJENJE I VODI KA SMANJENJU PRINOSA.

USLOVI KOJI TRENUTNO VLADAJU SU VEOMA POVOLJNI ZA RAZVOJ PEPELNICE. SUZBIJANJE OVOG PATOGENA U PERIODU CVETANJA JE VEOMA BITNO ZA OČUVANJE RODA.



SLIKA 3. PEPELNICA NA GROZDU (SIMPTOM IZ 2016. GODINE)

PREPORUKA

ZA SUZBIJANJE PEPELNICE VINOVE LOZE, PREPORUČUJE SE PRIMENA NEKOG OD REGISTROVANIH FUNGICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA/KONCENTRACIJA
POSTALON 90 SC	MIKLOBUTANIL + KVINOKSIFEN	0,8 – 1,25 L/HA

PEPELJASTI GROŽĐANI MOLJAC (*Lobesia botrana*)

PEPELJASTI GROŽĐANI MOLJAC JE NAJZNAČAJNIJA ŠTETOČINA U PROIZVODNJI GROŽĐA U NAŠIM USLOVIMA. U ZAVISNOSTI OD REGIONA, RAZVIJA TRI DO ČETIRI GENERACIJE GODIŠNJE.

ŠTETNI STADIJUM SU LARVE KOJE NAKON PILJENJA UPREDAJU CVASTI VINOVE LOZE UNUTAR KOJIH SE HRANE. LARVE PRVE GENERACIJE HRANE SE CVETOVIMA, A LARVE KASNIJIH GENERACIJA OŠTEĆUJU BOBICE.

NA PODRUČJU VOJVODINE U TOKU JE PROCES PILJENJA LARVI PRVE GENERACIJE PEPELJASTOG GROŽĐANOG MOLJCA.



SLIKA 4. LARVA PEPELJASTOG GROŽĐANOG MOLJCA NA CVASTI VINOVE LOZE

PREPORUKA

U PERIODU INTENZIVNOG PILJENJA LARVI PEPELJASTOG GROŽĐANOG MOLJCA PREPORUČUJE SE PRIMENA INSEKTICIDA SA LARVICIDNIM DELOVANJEM:

PREPARAT	AKTIVNAMATERIJA	DOZA
TALSTAR 10 EC, FOBOS EC, FUTOCID EC, BIFENIKUS	BIFENTRIN	0,02 – 0,05%