

O najznačajnijoj štetočini u proizvodnji jabuka, o jabukinom smotavcu

FAZE JABUKA

NA PODRUČJU VOJVODINE JABUKE SE NALAZE U FENOFAZI SAZREVANJA PLODOVA, PLODOVI DOBIJAJU BOJU KARAKTERISTIČNU ZA SORTU.



SLIKA 1: FAZA RAZVOJA JABUKA, OBOJAVANJE PLODOVA

JABUKIN SMOTAVAC (*Carpocapsa pomonella*)

JABUKIN SMOTAVAC JE NAJZNAČAJNIJA ŠTETOČINA JABUKE. U NAŠIM PROIZVODNIM USLOVIMA RAZVIJA TRI GENERACIJE GODIŠNJE. ŠTETE PRIČINJAVAJU LARVE KOJE SE UBUŠUJU U PLODOVE I ISHRANJUJU MESOM PLODA I SEMENKAMA. NAPADNUTI PLODOVI PREVREMENO OTPADAJU I GUBE TRŽIŠNU VREDNOST.

U REGIONU RUME LET LEPTIRA TREĆE GENERACIJE ZAPOČEO JE JOŠ PRE DESETAK DANA, NA REGIONIMA NOVOG SADA I PANČEVA TRENUTNO JE U TOKU LET I POLAGANJE JAJA TREĆE GENERACIJE OVE ŠTETOČINE. NA OSTALIM REGIONIMA JABUKIN SMOTAVAC JE PRED SAMIM IZLETANJEM TREĆE GENERACIJE.

VIZUELNIM PREGLEDIMA ZASADA REGISTRUJU SE SVEŽE POLOŽENA BELA JAJA.



SLIKA 2. SVEŽE POLOŽENO JAJE JABUKINOG SMOTAVCA NA LISTU



SLIKA 3-SVEŽE POLOŽENO JAJE JABUKINOG SMOTAVCA NA PLODU

PREPORUKA

S OBZIROM DA JE PROCES POLAGA JAJA U KONTINUITETU I DA ĆE VISOKE DNEVNE TEMPERATURE OMOGUĆITI POČETAK PILJENJA LARVI ZA PAR DANA, NEOPHODNO JE ZAŠTITITI PLODOVE JABUKA OD JABUKINOG SMOTAVCA. PREPORUČUJE SE PRIMENA INSEKTICIDA OVICIDNO-LARVICIDNOG DELOVANJA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	KONCENTRACIJA/DOZA
CORAGEN 20 SC	HLORANTRANILIPROL	0,016-0,02%

.....