

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI DOBRO DOŠLI U „ZELENU PROGNOZU“
DANAS VAS INFORMIŠEMO O PRISUTNIM ŠTETOČINAMA U PROIZVODNJI KUPUSA I
MERAMA NJIHOVE KONTROLE

FAZE KUPUSA

NA PODRUČJU VOJVODINE USEVI KUPUSA SE NALAZE U RAZLIČITIM FAZAMA RAZVOJA. KUPUSI ZA LETNJU PROIZVODNJU SE NALAZE U RAZLIČITIM FAZAMA RAZVOJA GLAVICE, DOK SU KUPUSI NAMENJENI ZA JESENJU PROIZVODNJU U RAZLIČITIM FAZAMA RAZVOJA LISTOVA.



SLIKA 1. FAZA RAZVOJA KUPUSA (LETNJI KUPUS)



SLIKA 2. FAZA RAZVOJA KUPUSA (JESENJI KUPUS)

KUPUSOV MOLJAC (*Plutella xylostella*)

KUPUSOV MOLJAC JE NAJZNAČAJNIJA ŠTETOČINA KUPUSA KOD NAS. ŠTETE PRAVE LARVE HRANEĆI SE LISTOVIMA, A U KASNIJIM FAZAMA RAZVOJA UBUŠUJU SE U GLAVICU. VISOKE TEMPERATURE POGODUJU RAZVOJU MOLJCA, TAKO DA JEDNA CELA GENERACIJA MOŽE DA SE RAZVIJE ZA SVEGA SEDAM DO DESET DANA. U NAŠIM AGROEKOLOŠKIM USLOVIMA KUPUSOV MOLJAC IMA SEDAM DO OSAM GENERACIJA, A NA PODRUČJU VOJVODINE JE ZAPOČELA AKTIVNOST ŠESTE GENERACIJE. NA BILJKAMA KUPUSA SE REGISTRUJE PRISUSTVO JAJA I LARVI KUPUSOVOG MOLJCA.



SLIKA 3. JAJE I LARVE KUPUSOVOG MOLJCA



SLIKA 4. LARVA KUPUSOVOG MOLJCA NA NALIČJU LISTA KUPUSA

PORED MOLJCA, U VIZUELNIM PREGLEDIMA BILJAKA KUPUSA UOČENO JE I PRISUSTVO:

- JAJA I LARVI MALOG KUPUSARA (*Pieris rapae*),
- ODRASLIH JEDINKI I LARVI TRIPSA (*Tysanoptera*),
- ODRASLIH JEDINKI BUVAČA (*Phyllotreta sp.*) I
- JAJA, LARVI I ODRASLIH JEDINKI BELE KUPUSNE MUŠICE (*Aleyrodes proletella*).



SLIKA 5. LARVE MALOG KUPUSARA NA NALIČJU LISTA KUPUSA



SLIKA 6. TRIPSA NA LISTU KUPUSA



SLIKA 7. ODRASLE JEDINKE BUVAČA NA LISTU KUPUSA



SLIKA 8. JAJA, LARVE I IMAGO KUPUSNE BELE MUŠICE NA LISTU KUPUSA

PREPORUKA

PROIZVOĐAČIMA SE PREPORUČUJE PREGLED USEVA NA PRISUSTVO ŠTETOČINA. UKOLIKO SE REGISTRUJE NJIHOVO PRISUSTVO, U CILJU ZAŠTITE KUPUSA, PREPORUČUJE SE PRIMENA HEMIJSKIH MERA ZAŠTITE.

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA
CORAGEN 20 SC	HLORANTRANILIPROL	0,14-0,2 L/HA

PRILIKOM PRIMENE PESTICIDA OBAVEZNO SE TREBA PRIDRŽAVATI UPUTSTVA ZA UPOTREBU I PROPISANIH KARENCI. KARENCA JE VREME IZRAŽENO U DANIMA KOJE TREBA DA PROTEKNE OD POSLEDNJE PRIMENE PESTICIDA DO BERBE KAKO BI PROIZVOD BIO BEZBEDAN ZA LJUDSKU UPOTREBU. KARENCA ZA NAVEDENI INSEKTICID IZNOSI SEDAM DANA.

.....
POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I POŠTOVANI GLEDAOCI, DETALJNIJE INFORMACIJE O POJAVI ŠTETNIH ORGANIZAMA I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI NA SAJTU PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE
WWW.PISVOJVODINA.COM