

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI DOBRO DOŠLI U „ZELENU PROGNOZU“

DANAS VAS INFORMIŠEMO O AKTUELNOJ ZAŠTITI JABUKE OD PROUZROKOVAČA BOLESTI

.....

NA PODRUČJU VOJVODINE, ZASADI JABUKA SE NALAZE U FAZI OD POJAVE PRVIH LISTIĆA DO DO POJAVE CRVENIH CVETNIH PUPOLJAKA.

ZA NAMA JE VIŠEDNEVNI KIŠNI PERIOD. NA AUTOMATSKIM METEOROLOŠKIM STANICAMA KOJE SU SMEŠTENE U ZASADIMA NA PODRUČJU VOJVODINE, U PERIODU OD ČETVRTKA DO JUČE, REGISTROVANO JE OD 6 DO 36 MILIMETARA PADAVINA. TOKOM TOG PERIODA OSTVARENI SU USLOVI ZA INFEKCIJU NAJZNAČAJNIJIM PATOGENOM U PROIZVODNJI JABUKA, PROUZROKOVAČEM ČAĐAVE PEGAVOSTI LISTA I KRASTAVOSTI PLODOVA JABUKA. TO JE PATOGEN KOJI SE JAVLJA SVAKE GODINE U SVAKOM JABUČNJAKU NA GOTOVO SVAKOM STABLU.

USLED ZARAZE OVOM GLJIVOM DOLAZI DO PREVREMENOG OPADANJA LIŠĆA ŠTO DOVODI DO ISCRPLJIVANJA BILJAKA I SMANJENJA RODNOSTI U NAREDNOJ GODINI. ZARAŽENI PLODOVI SA SIMPTOMIMA KRASTAVOSTI GUBE TRŽIŠNU VREDNOST.

KAKO JE PRED NAMA NOVI VIŠEDNEVNI KIŠNI PERIOD KOJI SE NAJAVLJUJE OD ČETVRTKA, A JABUKE ULAZE U IZUZETNO OSETLJIVU FAZU-FAZU CVETANJA, VRLO JE VAŽNO DA SE SPROVEDE PRAVOVREMENA ZAŠTITA FUNGICIDIMA U JABUČNJACIMA.

#### PREPORUKA

OD SUTRA SE NAJAVLJUJE PORAST TEMPERATURA VAZDUHA, A PREPORUKA JE DA SE TRETMAN SPROVEDE ILI SUTRA ILI U SREDU, PRE PADAVINA NAJAVLJENIH ZA ČETVRTAK, SLEDEĆOM KOMBINACIJOM FUNGICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA/KONCENTRACIJA
MANKOGAL 80, DITHANE M 45, MANKOGAL EKSTRA, PREVENT 80 WP, MANFIL 80 WP, NOTA 75 WG, MANKOSAV 75 WG, PENNCOZEB WG, TITULAR 75 WDG, CANDEZA	MANKOZEB	0,25%
+		
PYRUS 400 SC, PEHAR	PIRIMETANIL	1 L/HA


U OVIM FAZAMA RAZVOJA JABUKA VEOMA JE VAŽNO SPROVESTI I ZAŠTITU OD PROUZROKOVAČA PEPELNICE JABUKE, NAROČITO U JABUČNJACIMA SA OSETLJIVIM SORTIMENTOM POPUT AJADREDA, JONAGOLDA, RED JONAPRINCA I DR. I GDE SU PROŠLE GODINE UOČENI SIMPTOMI. USLED ZARAZE PEPELNICOM DOLAZI DO NEKROZE CVETOVA, LISTOVA I MLADARA KOJI SE NA KRAJU I SUŠE, ŠTO DOVODI DO SMANJENJA PRINOSA I

RODNOSTI U NAREDNOJ GODINI. SA CILJEM ZAŠTITE JABUKE OD TOG PATOGENA  
PREPORUČUJE SE PRIMENA FUNGICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA
KARATHANE GOLD 350 EC	MEPTILDINOKAP	0,4-0,5 L/HA



SLIKA 1. FAZA RAZVOJA JABUKE



SLIKA 2. FAZA RAZVOJA JABUKA



SLIKA 3. SIMPTOM ČAĐAVE PEGAVOSTI NA LISTU JABUKE



SLIKA 4. SIMPTOM ČAĐAVE KRSTAVOSTI NA PLODU





SLIKA 5. PEPLNICA JABUKE

.....  
POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I POŠTOVANI GLEDAOCI, DETALJNIJE  
INFORMACIJE O POJAVI ŠTETNIH ORGANIZAMA I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI  
NA SAJTU PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE  
[WWW.PISVOJVODINA.COM](http://WWW.PISVOJVODINA.COM)