

O najznačajnijoj štetočini u proizvodnji jabuka, o jabukinom smotavcu

FAZE JABUKA

NA PODRUČJU VOJVODINE JABUKE SE NALAZE U FENOFAZI PORASTA PLODOVA KOJI SU DOSTIGLI OKO POLOVINE KRAJNJE VELIČINE.



SLIKA1-FAZA RAZVOJA JABUKE SORTE AJDARED

JABUKIN SMOTAVAC (*Carpocapsa pomonella*)

JABUKIN SMOTAVAC JE NAJZNAČAJNIJA ŠTETOČINA JABUKE. U NAŠIM PROIZVODNIM USLOVIMA RAZVIJA TRI GENERACIJE GODIŠNJE.

ŠTETE PRIČINJAVAJU LARVE KOJE SE UBUŠUJU U PLODOVE I ISHRANJUJU MESOM PLODA I SEMENKAMA. NAPADNUTI PLODOVI PREVREMENO OTPADAJU I GUBE TRŽIŠNU VREDNOST.

U SVIM REGIONIMA VOJVODINE U TOKU JE LET LEPTIRA DRUGE GENERACIJE OVE ŠTETOČINE.

NA PLODOVIMA SE REGISTRUJU POLOŽENA JAJA RAZLIČITIH STADIJUMA RAZVOJA. PRISUTNA SU SVEŽE POLOŽENA-BELA JAJA, JAJA U RAZVOJU-SA CRVENIM OREOLOM I JAJA NEPOSREDNO PRED PILJENJE – JAJA SA CRNOM

GLAVOM. TAKOĐE, NA PLODOVIMA REGISTROVANO JE I PRISUSTVO TEK ISPILJENIH LARVI.

U ZASADIMA JABUKA NA PODRUČJU VOJVODINE ZAPOČEO JE PERIOD PILJENJA LARVI DRUGE GENERACIJE JABUKINOG SMOTAVCA.



SLIKA2-SVEŽE POLOŽENO JAJE JABUKINOG SMOTAVCA NA PLODU



SLIKA3-JAJE SA CRVENIM OREOLOM NA LISTU JABUKE



SLIKA4-JAJE SA CRNOM GLAVOM NA PLODU JABUKE



SLIKA5- JAJE SA CRNOM GLAVOM (UVEĆANO)

PREPORUKA

U CILJU ZAŠTITE PLODOVA JABUKE OD JABUKINOG SMOTAVCA
PREPORUČUJE SE PRIMENA INSEKTICIDA OVICIDNO-LARVICIDNOG
DELOVANJA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	KONCENTRACIJA/DOZA
CORAGEN 20 SC	HLORANTRANILIPROL	0,016-0,02%

.....