

## Zelena prognoza za 4.7.2018. - O šljivinom smotavcu

### FAZE ŠLJIVE

NA PODRUČJU VOJVODINE ZAPOČELA JE BERBA RANOSTASNIH SORTI ŠLJIVE, DOK SE SREDNJESTASNE I KASNOSTASNE SORTE NALAZE U FAZI OBOJAVANJA PLODA



SLIKA 1. FAZA RAZVOJA ŠLJIVA

### ŠLJIVIN SMOTAVAC (*Grapholita funebrana*)

U OVOJ FAZI RAZVOJA PLODOVA, VAŽNO JE OBRATITI PAŽNJU NA NAJZNAČAJNIJU ŠTETOČINU ŠLJIVE-ŠLJIVINOG SMOTAVCA. OVA ŠTETOČINA U NAŠIM PROIZVODNIM USLOVIMA RAZVIJA TRI GENERACIJE GODIŠNJE. ŠTETE PRIČINJAVAJU LARVE KOJE SE UBUŠUJU U PLODOVE I HRANE SE MESOM PLODA. NAPADNUTI PLODOVI SE PREPOZNAJU PO SMOLOTOČINI KOJA CURI IZ NJIH I PO TOME ŠTO DOLAZI DO PREVREMENOG SAZREVANJA I OPADANJA PLODOVA.

VIZUELNIM PREGLEDIMA ZASADA ŠLJIVA REGISTROVANA SU JAJA OVE ŠTETOČINE NA PLODOVIMA. PORED SVEŽE POLOŽENIH JAJA, REGISTRUJU SE I JAJA U ODMAKLIM FAZAMA RAZVOJA (JAJA SA CRNOM GLAVOM KOJA SU PRED SAMIM PILJENJEM), KAO I TEK ISPILJENE LARVE.

**NA REGIONU NOVOG SADA I PANČEVA U TOKU JE POČETAK PILJENJA LARVI TREĆE GENERACIJE ŠLJIVINOG SMOTAVCA, DOK SE NA OSTALIM REGIONIMA POČETAK PILJENJA OVE ŠTETOČINE OČEKUJE ZA NEKOLIKO DANA.**



SLIKA 2. POLOŽENO JAJE ŠLJIVINOG SMOTAVCA NA PLODU



SLIKA 3. POLOŽENO JAJE ŠLJIVINOG SMOTAVCA NA PLODU



SLIKA 4. LARVA ŠLJIVINOG SMOTAVCA NA PLODU

#### PREPORUKA

NA POČETKU PILIENJA LARVI ŠLJIVINOG SMOTAVCA, U CILJU SPREČAVANJA NJIHOVOG UBUŠIVANJA U PLODOVE, PREPORUČUJU SE HEMIJSKE MERE ZAŠTITE SLEDEĆIM INSEKTICIDOM:

| PREPARAT      | AKTIVNA MATERIJA  | KONCENTRACIJA |
|---------------|-------------------|---------------|
| CORAGEN 20 SC | HLORANTRANILIPROL | 0,02%         |

**U ZASADIMA U KOJIMA JE U TOKU BERBA ILI SE ONA OČEKUJE U NAREDNE DVE NEDELJE, NIKAKO NE PRIMENJIVATI HEMIJSKE MERE ZAŠTITE.**