

O STANJU U USEVIMA KUPUSA

FAZE KUPUSA

NA PODRUČJU VOJVODINE USEVI RANOG KUPUSA NALAZE SE U FAZI OD DEVET I VIŠE LISTOVA RAZVIJENO DO FAZE GLAVICE DOSTIGLE 30% KRAJNJE VELIČINE.

KUPUSNI MOLJAC (*Plutella maculipennis*)

KUPUSNI MOLJAC JE VEOMA ZNAČAJNA ŠTETOČINA KUPUSNJAČA NA NAŠEM TERENU. U POSLEDNJIH NEKOLIKO GODINA OVA ŠTETOČINA JE KAO I DRUGI MOLJCI U PROGRESIJI NA NAŠEM PROIZVODNOM PODRUČJU.

TOKOM JEDNE GODINE U NAŠIM USLOVIMA RAZVIJA SEDAM DO OSAM GENERACIJA.

ŠTETE PRIČINJAVAJU GUSENICE KOJE SE HRANE LISTOVIMA KUPUSNJAČA, A U KASNIJIM FAZAMA RAZVOJA UBUŠUJU SE U GLAVICU. PRI JAČEM NAPADU DOLAZI DO GOLOBRSTA KADA OSTAJU SAMO GLAVNI NERVI NA LISTOVIMA KUPUSNJAČA.

U REGIONU PANČEVA, VIZUELIM PREGLEDOM USEVA KUPUSA REGISTROVANO JE PRISUSTVO JAJA I GUSENICA KOJE SE NALAZE NA NALIČJU LISTA I U TOKU JE PERIOD PILJENJA GUSENICA PRVE GENERACIJE KUPUSNOG MOLJCA. NA OSTALIM REGIONIMA VOJVODINE NALAZIMO SE PRED PILJENJEM GUSENICA.



SLIKA 1. GUSENICA KUPUSNOG MOLJCA NA NALIČJU LISTA KUPUSA

PREPORUKA

PROIZVOĐAČIMA KUPUSNJAČA SE PREPORUČUJE PREGLED USEVA NA PRISUSTVO GUSENICA KUPUSNOG MOLJCA. UKOLIKO SE REGISTRUJE NJIHOVO PRISUSTVO PREPORUČUJE SE PRIMENA SLEDEĆEG INSEKTICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA
KING, KOZAK, LAMBADA, LAMDEX	LAMBDA-CIHALOTRIN	0,3 L/HA