

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI DOBRO DOŠLI U „ZELENU PROGNOZU“
DANAS VAS INFORMIŠEMO O STANJU U USEVIMA LUKA

.....

FAZE LUKA

NA PODRUČJU VOJVODINE, USEVI PROLEĆNOG LUKA IZ SEMENA SE NALAZE U FAZI OD 4 DO 5 LISTOVA RAZVIJENO, DOK SE LUKOVI IZ ARPADŽIKA NALAZE U FAZI OD 6 DO 8 RAZVIJENIH LISTOVA.



SLIKA 1. USEV LUKA IZ ARPADŽIKA

PLAMENJAČA LUKA (*Peronospora destructor*)

SIMPTOMI PLAMENJAČE LUKA SE NA PARCELI JAVLJAJU PO OAZAMA. NA LISTOVIMA SE REGISTRUJU BLEDE OVALNE PEGE RAZLIČITIH VELIČINA. U USLOVIMA POVEĆANE VLAŽNOSTI, U OKVIRU OVIH IZDUŽENIH PEGA FORMIRAJU SE SPORONOSNI ORGANI GLJIVE. PEGE MENJAJU BOJU PREMA LJUBIČASTOJ, A ZARAŽENI LISTOVI VENU I NA KRAJU SASVIM PROPADAJU. IZ LISTA SE ZARAŽA DALJE ŠIRI PREMA GLAVICI ŠTO MOŽE DA DOVEDE DO ZARAŽE UNUTRAŠNJIH LJUSPASTIH LISTIĆA. OVAKVI LUKOVI NISU POGODNI ZA SKLADIŠTENJE I PODLOŽNI SU NAPADU DRUGIH PATOGENA.



SLIKA 2. SIMPTOM PLAMENJAČE NA LISTU LUKA



SLIKA 3. SIMPTOM PLAMENJAČE NA LISTU LUKA

U PROTEKLOM PERIODU KONSTANTNO SE REGISTRUJU VEOMA POVOLJNI USLOVI ZA INFEKCIJE PROUZROKOVAČEM PLAMENJAČE LUKA (*Peronospora destructor*). NAJAVLJENO NESTABILNO VREME SA PADAVINAMA I PROGNOZIRANE TEMPERATURE U NAREDNOM PERIODU POGODOVAĆE RAZVOJU OVOG PATOGENA.

PREPORUKA

KAKO SU USLOVI ZA RAZVOJ PLAMENJAČE LUKA VEOMA POVOLJNI PREPORUČUJE SE PRIMENA FUNGICIDA KOJI IMAJU KONTAKTNO I SISTEMIČNO DELOVANJE:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA
ORTIVA OPTI 480 SC, PROMESA PLUS	HLOROTALONIL+AZOKSISTROBIN	2,5 L/HA
FOLIO GOLD	HLOROTALONIL+METALAKSIL	2-2,5 L/HA
VERITA	FOSETIL-ALUMINIJUM+FENAMIDON	2-2,5 KG/HA

TEKST KOJI SE ČITA DOK JE NA EKRANU TABELA

S OBZIROM DA SU OVO JEDINI PREPARATI KOJI SU REGISTROVANI U LUKU ZA SUZBIJANJE PLAMENJAČE I KOJI IMAJU U SEBI SISTEMIČAN I KONTAKTNI FUNGICID, ZBOG ZABRANE KORIŠĆENJA AKTIVNE MATERIJE HLOROTALONIL U ZEMLJAMA EVRPSKE UNIJE, PROIZVOĐAČI KOJI SU ORIJENTISANI KA IZVOZU, PREPORUKA JE DA PRIMENE PREPARAT VERITA. MEĐUTIM, ZBOG OGRANIČENJA U PRIMENI I AKTIVNE MATERIJE FENAMIDON KOJA JE SASTAVNI DEO OVOG PREPARATA, TREBA STROGO VODITI RAČUNA O KARENCI KOJA IZNOSI 14 DANA I MAKSIMALNOM BROJU TRETMANA U ISTOJ VEGETACIJI KOJI IZNOSI TRI PUTA.

TRIPSI

VIZUELNIM PREGLEDIMA USEVA LUKA REGISTROVANO JE PRISUSTVO ODRASLIH JEDINKI I LARVI TRIPSA. NA POJEDINIM PARCELAMA DOSTIGNUT JE PRAG ŠTETNOSTI OD 1 DO 2 LARVE TRIPSA PO LISTU LUKA.

ZADOVOLJAVAJUĆI REZULTATI U SUZBIJANJU TRIPSA POSTIŽU SE SAMO UKOLIKO NE DOĐE DO PRENAMNOŽENJA OVE ŠTETOČINE. PROIZVOĐAČIMA SE PREPORUČUJE PREGLED NA PRISUSTVO TRIPSA I PO POSTIZANJU PRAGA ŠTETNOSTI SPROVOĐENJE MERA ZAŠTITE NEKIM OD REGISTROVANIH INSEKTICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA
DICARZOL 50 SP	FORMETANAT-HIDROHLORID	1 KG/HA
EXIREL	CIJANTRANILIPROL	0,75 L/HA



SLIKA 4. LARVE TRIPSA U PAZUHU LISTOVA LUKA

.....
POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I POŠTOVANI GLEDAOCI, DETALJNIJE
INFORMACIJE O POJAVI ŠTETNIH ORGANIZAMA I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI
NA SAJTU PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE
WWW.PISVOJVODINA.COM