

O rđastoj grinji jabuke

RDASTA GRINJA JABUKE (*Aculus schlechtendali*)

RDASTA GRINJA JABUKE PRIPADA GRUPI ERIOFIDNIH GRINJA. OVA ŠTETOČINA IMA VIŠE GENERACIJA GODIŠNJE I ZA KRATKO VREME, U POVOLJNIM USLOVIMA, MOŽE DOĆI DO NJENOG PRENAMNOŽENJA.

SUVO I TOPLO VREME SA VISOKIM DNEVNIM TEMPERATURAMA DOPRINOSI BRZOM RAZMNOŽAVANJU GRINJA.

ŠTETNI SU SVI POKRETNI STADIJUMI GRINJA KOJI SE HRANE NA LIŠĆU SISANJEM SOKOVA. NAPADNUTO LIŠĆE DOBIJA BRONZASTU BOJU I UVIJA SE PREMA LICU. JAKO NAPADNUTO LIŠĆE SE SUŠI I PREVREMENO OPADA. KOD NAPADNUTOG LIŠĆA OMETENA JE FOTOSINTEZA I POJAČANA JE TRANSPIRACIJA ŠTO DOVODI DO IZNURIVANJA VOĆAKA, SMANJENJA PRINOSA I KVALITETA PLODOVA, A ŠTETNOST SE MOŽE ODRAZITI I U NAREDNOJ GODINI.

SA LISTOVA GRINJA PRELAZI I NA PLODOVE GDE USLED ISHRANE DOLAZI DO POJAVE MREŽAVOSTI NAROČITO NA CRVENIM SORTAMA.



SLIKA1-SIMPTOMI PRISUSTVA RĐASTE GRINJE JABUKE NA LISTOVIMA

OVE ŠTETOČINE IMAJU IZDUŽENO TELO VEOMA SITNIH DIMENZIJA. VELIČINA ODRASLIH JEDINKI SE KREĆE OD 160 DO 180 MIKROMETARA.



SLIKA2-RĐASTA GRINJA JABUKE NA LICU LISTA



SLIKA3-RĐASTA GRINJA JABUKE NA LICU LISTA

TRENUTNI USLOVI POGODUJU RAZVOJU OVE ŠTETOČINE I U ZASADIMA JABUKA REGISTRUJE SE POVEĆANJE BROJNOSTI RĐASTE GRINJE JABUKE.

PREPORUKA

PREGLEDATI ZASADE JABUKA I UKOLIKO SE KONSTATUJE PRISUSTVO OVE ŠTETOČINE SPROVESTI MERE ZAŠTITE SLEDEĆIM AKARICIDIMA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	KONCENTRACIJA/DOZA
ABASTATE EW	ABAMEKTIN	0,15%
ORTUS 5 SC	FENPIROKSIMAT	0,1%
OMITE 570 EW	PROPARGIT	0,15%

PRIMENA AKARICIDA U CILJU SUZBIJANJA GRINJA TREBA DA SE SPROVEDE SA VEĆOM KOLIČINOM VODE UZ DODATAK OKVAŠIVAČA ILI MINERALNOG ULJA. ZA EFIKASNO SUZBIJANJE RĐASTE GRINJE JABUKE PREPORUČUJU SE DVA VEZANA TRETMANA U RAZMAKU OD 7 DANA.

.....
!