

O ŠLJIVINOM SMOTAVCU

FAZE ŠLIVE

NA PODRUČJU VOJVODINE ŠLJIVE SE NALAZE U FAZI PLODOVI DOSTIGLI 70% KRAJNJE VELIČINE.



SLIKA 1. FAZA RAZVOJA ŠLJIVA

ŠLJIVIN SMOTAVAC (*Grapholita funebrana*)

U OVOJ FAZI RAZVOJA PLODOVA, VAŽNO JE OBRATITI PAŽNJU NA NAJZNAČAJNIJU ŠTETOČINU ŠLJIVE-ŠLJIVINOG SMOTAVCA.

OVA ŠTETOČINA U NAŠIM PROIZVODNIM USLOVIMA RAZVIJA TRI GENERACIJE GODIŠNJE. ŠTETE PRIČINJAVAJU LARVE KOJE SE UBUŠUJU U PLODOVE I HRANE SE MESOM PLODA. NAPADNUTI PLODOVI SE PREPOZNAJU PO SMOLOTOČINI KOJA CURI IZ NJIH I PO TOME ŠTO DOLAZI DO PREVREMENOG SAZREVANJA I OPADANJA PLODOVA.

VIZUELNIM PREGLEDIMA ZASADA ŠLJIVA REGISTROVANA SU JAJA OVE ŠTETOČINE NA PLODOVIMA. PORED SVEŽE POLOŽENIH JAJA, REGISTRUJU SE I JAJA U ODMAKLIM FAZAMA RAZVOJA (JAJA SA CRNOM GLAVOM KOJA SU PRED SAMIM PILJENJEM), KAO I TEK ISPILJENE LARVE.

U TOKU JE INTENZIVNO PILJENJE LARVI DRUGE GENERACIJE ŠLJIVINOG SMOTAVCA.



SLIKA 2. SVEŽE POLOŽENO I ISPILJENO JAJE ŠLJIVINOG SMOTAVCA



SLIKA 3. JAJE SA CRNOM GLAVOM, NEPOSREDNO PRED PILJENJE LARVE

PREPORUKA

U CILJU SPREČAVANJA UBUŠIVANJA LARVI ŠLJIVINOG SMOTAVCA U PLODOVE, NEOPHODNO JE SPROVESTI MERE ZAŠTITE REGISTROVANIM INSEKTICIDOM:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA/KONCENTRACIJA
GROM	LAMBDA-CIHALOTRIN	0,03%

KARENCA ZA PREPARAT GROM IZNOSI 14 DANA.