

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI DOBRO DOŠLI U „ZELENU PROGNOZU“
DANAS VAS INFORMIŠEMO O STANJU U ZASADIMA KAJSIJA

FENOFAZE KOŠTIČAVOG VOĆA

NA PODRUČJU VOJVODINE NAJRANIJE SORTE KAJSIJA SE NALAZE U FAZI POČETKA CVETANJA DOK SU OSTALE SORTE U FAZI BUBRENJA I OTVARANJA PUPOLJAKA.



SLIKA1 . FAZA RAZVOJA KAJSIJE



SLIKA 2. FAZA RAZVOJA KAJSIJE

TRENUTNO JE U PROIZVODNJI KAJSIJA AKTUELNA ZAŠTITA OD PROUZROKOVAČA SUŠENJA CVETOVA I GRANČICA I TRULEŽI PLODOVA KOŠTIČAVOG VOĆA (*Monilia laxa*).

OVA GLJIVA MOŽE DA SE RAZVIJA I PROUZROKUJE ŠTETE NA CVETOVIMA, PLODOVIMA I MLADARIMA. PREZIMLJAVA U OBILKU MICELIJE U RAK RANAMA NA KORI, MUMIFICIRANIM PLODOVIMA I NA POVRŠINI ZEMLJIŠTA. INFEKCIJA CVETA OSTVARUJE SE PREKO ŽIGA TUČKA PRI VLAŽNIM USLOVIMA, A POVOLJNI USLOVI ZA INFEKCIJE I BRZU POJAVU BOLESTI SU PRISUSTVO VLAGE ILI VISOKA RELATIVNA VLAŽNOST VAZDUHA (PREKO 85%) I TEMPERATURE OKO 20°C.

NA PLODOVIMA DO INFEKCIJE DOLAZI PREKO RANA ILI POVREDA. U VREME SAZREVANJA PLODOVA TRULEŽ SE BRZO ŠIRI I NAPADNUTI PLODOVI SE SUŠE I PRETVARJU U MUMIJE KOJE SLUŽE ZA PREZIMLJAVANJE PATOGENA.

DO ZARAZE MLADARA I GRANČICA DOLAZI PREKO INFICIRANIH CVETOVA I PLODOVA I NA NJIMA SE JAVLJAJU ULEGNUTE PEGE MRKE BOJE. NA OVIM ULEGNUĆIMA SE, TOKOM VIŠE GODINA, STVARAJU RAK RANE KOJE TAKOĐE SLUŽE ZA PREZIMLJAVANJE.



SLIKA 3. SIMPTOM ZARAZE OD *Monilinia laxa*



SLIKA 4. SIMPTOM ZARAZE OD *Monilinia laxa*



SLIKA 5. SIMPTOM ZARAZE OD *Monilinia laxa*



SLIKA 6. SIMPTOM ZARAZE OD *Monilinia laxa*

PREPORUKA

U ZAŠTITI KAJSIJA OD OVOG PATOGENA VEOMA JE VAŽNO IMATI U VIDU ČINJENICU DA UKOLIKO DOĐE DO OSTVARENJA INFEKCIJE NEMOGUĆE JE SPREČITI DALJI RAZVOJ GLJIVE PRIMENOM FUNGICIDA, TE SU PREVENTIVNE MERE ZAŠTITE OD KLJUČNOG ZNAČAJA.

TREBA PRATITI FAZU RAZVOJA KOŠTIČAVOG VOĆA I VREMENSKE USLOVE. U FAZAMA CVETANJA I PRED NAJAVLJENE PADAVINE PREPORUKA JE PRIMENA REGISTROVANIH FUNGICIDA:

| PREPARAT | AKTIVNA MATERIJA | KONCENTRACIJA |
|----------|------------------|---------------|
| OCTAVE | PROHLORAZ | 0,04% |

PRILIKOM PRIMENE FUNGICIDA TREBA SE PRIDRŽAVATI UPUTSTVA ZA UPOTREBU. U FAZAMA CVETANJA VOĆA POSEBNU PAŽNJU TREBA OBRATITI NA PRISUSTVO PČELA I DRUGIH POLINATORA, A HEMIJSKE TRETMANE TREBA SPROVODITI U VEČERNJIM SATIMA KADA OPRAŠIVAČI NISU PRISUTNI NA CVETOVIMA.

.....
POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I POŠTOVANI GLEDAOCI, DETALJNIJE INFORMACIJE O POJAVI ŠTETNIH ORGANIZAMA I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI NA SAJTU PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE WWW.PISVOJVODINA.COM