

BILJNA VRSTA: BRESKVA I NEKTARINA

TEMA: PRISUSTVO TRIPSA U BRESKVAMA I NEKTARINAMA I NJIHOVO SUZBIJANJE

NA PODRUČJU VOJVODINE ZASADI BRESAKA I NEKTARINA SE, U ZAVISNOSTI OD SORTIMENTA I LOKALITETA, NALAZE U FAZI OD CVETOVI SE SMEŽURAVAJU, VEĆINA LATICA OPADA DO KRAJ CVETANJA, SVE LATICE OPALE.

PREGLEDOM CVETOVA I OTRESANJEM GRANA BRESAKA I NEKTARINA NA BELU PODLOGU REGISTROVANO JE PRISUSTVO TRIPSA.

TRIPSI SU SIĆUŠNI ORGANIZMI VELIČINE TELA OKO 1 MM I IMAJU SPLJOŠTENI I IZDUŽENO TELO KOJE SE NA KRAJEVIMA SUŽAVA. SA CVETANJEM BRESAKA I NEKTARINA DOLAZI DO MIGRACIJE TRIPSA SA SPONTANE KOROVSKE FLORE NA CVETOVE VOĆA.

ŠTETE OD TRIPSA NASTAJU USLED ISHRANE LARVI I ODRASLIH JEDINKI KOJE SISAJU SOKOVE BILJAKA. NA NAPADNUTIM CVETOVIMA DOLAZI DO OŠTEĆENJA LATICA, PRAŠNIKA I TUČKA. ŠTETE NA CVETOVIMA NASTAJU I PRILIKOM POLAGANJA JAJA ŽENKI NA NJIH. NA NAPADNUTIM PLODOVIMA DOLAZI DO POJAVE OŽILJAKA I ONI PREVREMENO OPADAJU. UKOLIKO PLODOVI NASTAVE SA SVOJIM RAZVOJEM DOLAZI DO NJIHOVOG PUCANJA I ČESTO IZ NJIH CURI SMOLA. PORED DIREKTNIH ŠTETA, POJEDINE VRSTE TRIPA POPUT KALIFORNIJSKOM CVETNOG TRIPSA, SU KARANTINSKE U NEKIM ZEMLJAMA GDE SE IZVOZI NAŠE VOĆE, ŠTO MOŽE DA UGROZI IZVOZ NAŠIH PROIZVODA.

PREPORUKA: PROIZVOĐAČIMA SE PREPORUČUJE PREGLED ZASADA BRESAKA I NEKTARINA NA PRISUSTVO TRIPSA. UKOLIKO SE REGISTRUJE NJIHOVO PRISUSTVO PREPORUČUJE SE PRIMENA HEMIJSKIH MERA ZAŠTITE NEKIM OD REGISTROVANIH INSEKTICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA
EXIREL	CIJANTRANILIPROL	0,075 – 0,1%
DELEGATE	SPINETORAM	0,3 KG/HA

PRIMENA HEMIJSKIH MERA ZAŠTITE U ZASADIMA BRESAKA I NEKTARINA ISKLJUČIVO SE PREPORUČUJE SAMO KOD ZASADA KOJI SU UŠLI U FAZE PRECVETAVANJA I U KOJIMA VIŠE NISU PRISUTNE PČELE I DRUGI POLINATORI!

PRIMENA INSEKTICIDA U FAZAMA CVETANJA VOĆA JE ZAKONOM ZABRANJENA!



SLIKA 1. PRECVETAVANJE BRESKVE



SLIKA 2. ODRASLE JEDINKE TRIPSA



SLIKA 3. ODRASLA JEDINKA TRIPSA NA CVETU BRESKVE



SLIKA 4. SIMPTOM OŠTEĆENJA OD TRIPSA NA PLODU BRESKVE



SLIKA 5. SIMPTOM OŠTEĆENJA OD TRIPSA NA PLODU NEKTARINE