

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI DOBRO DOŠLI U „ZELENU PROGNOZU“
DANAS VAS INFORMIŠEMO O STANJU U ZASADIMA VINOVE LOZE I MERAMA ZAŠTITE OD PROUZROKOVAČA BOLESTI I ŠTETOČINA

FAZE VINOVE LOZE

NA PODRUČJU VOJVODINE, U ZAVISNOSTI OD SORTIMENTA I LOKALITETA, VINOVA LOZA SE NALAZI U FAZI OD TRI LISTA RAZVIJENA DO FAZE CVAST JASNO VIDLJIVA.



SLIKA 1. FAZA RAZVOJA VINOVE LOZE

CRNA PEGAVOST VINOVE LOZE (*Phomopsis viticola*)

CRNA PEGAVOST VINOVE LOZE JE BOLEST KOJA SE REDOVNO JAVLJA U NAŠIM VINOGORJIMA. SIMPTOMI PRISUSTVA OVE GLJIVE NAJJASNIJE SE UOČAVAJU U PROLEĆE. ZARAŽENI LASTARI SU SIVOBELI BOJE I NA NJIMA SE NALAZE CRNI PIKNIDI ODNOSNO PLODONOSNA TELA OVE GLJIVE. LASTARI SU OŠTEĆENI U OSNOVI, DOLAZI DO NJIHOVOG PRSTENOVANJA I LOMLJENJA, A CVASTI I GROZDOVI SE SUŠE. NAPADNUTA LOZA SLABIJE DOZREVA I LAKŠE IZMRZAVA U TOKU ZIME.

U POČETKU RAZVOJA VINOVE LOZE I U VLAŽNIM USLOVIMA IZ PIKNIDA CURE SPORE KOJE VRŠE ZARAZU MLADOG ZELENOG TKIVA.

VIZUELNIM PREGLEDIMA ZASADA VINOVE LOZE REGISTRUJE SE DOMINANTNO PRISUSTVO NEAKTIVIRANIH PIKNIDA, IZ KOJIH ĆE U USLOVIMA VLAŽENJA, DOĆI DO OSLOBAĐANJA PIKNOSPORA.



SLIKA 2. SIMPTOMI CRNE PEGAVOSTI VINOVE LOZE NA LASTARU



SLIKA 3. PIKNIDI CRNE PEGAVOSTI NA KORI LASTARA

PREPORUKA

U ZASADIMA GDE SU REGISTROVANI SIMPTOMI OVOG PATOGENA, PRE NAJAVLJENIH PADAVINA, PREPORUČUJE SE TRETMAN NEKIM OD SLEDEĆIH FUNGICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	KONCENTRACIJA
DITHANE 45 M, MANKOGAL 80, MANKOGAL EKSTRA	MANKOZEB	0,2-0,25%

PEPELNICA VINOVE LOZE (*Uncinula necator*)

PEPELNICA VINOVE LOZE JE VEOMA ZNAČAJNO OBOLJENJE KOJE SE SVAKE GOVINE JAVLJA U NAŠIM VINOGRADIMA. NAPADA SVE ZELJASTE DELOVE VINOVE LOZE, LIŠĆE, LASTARE CVETOVE I GROZDOVE. U POVOLJNIM USLOVIMA ZA RAZVOJ MOŽE DOVESTI DO ZNAČAJNOG GUBITKA PRINOSA.



SLIKA 4. SIMPTOM PEPELNICE NA LISTU VINOVE LOZE



SLIKA 5. SIMPTOM PEPELNICE NA GROZDU VINOVE LOZE

PREPORUKA

U ZASADIMA KOJI SU U FAZI RAZVOJA CVASTI, NAROČITO KOD OSETLJIVOG SORTIMENTA NA PEPELNICU POPUT FRANKOVKE, ŽUPLJANKE I DRUGIH, U CILJU ZAŠTITE OD OVOG PATOGENA, PREPORUČUJU SE HEMIJSKE MERE ZAŠTITE PRIMENOM SLEDEĆEG FUNGICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	KONCENTRACIJA
KARATHANE GOLD 350 EC	MEPTILDINOKAP	0,4-0,5 L/HA

PEPELJASTI GROŽĐANI MOLJAC (*Lobesia botrana*)

PEPELJASTI GROŽĐANI MOLJAC JE NAJZNAČAJNIJA ŠTETOČINA U PROIZVODNJI GROŽĐA U NAŠIM USLOVIMA.

ŠTETNI STADIJUM SU LARVE KOJE NAKON PILJENJA UPREDAJU CVASTI VINOVE LOZE UNUTAR KOJIH SE HRANE. LARVE PRVE GENERACIJE HRANE SE CVETOVIMA, A LARVE KASNIJIH GENERACIJA OŠTEĆUJU BOBICE.

NA PODRUČJU VOJVODINE U TOKU JE LET PRVE GENERACIJE PEPELJASTOG GROŽĐANOG MOLJCA I POČETAK POLAGANJA JAJA.



SLIKA 4. POLOŽENA JAJA PEPELJASTOG GROŽĐANOG MOLJCA

PREPORUKA

U CILJU ZAŠTITE VINOVE LOZE OD PEPELIJASTOG GROŽĐANOG MOLJCA PREPORUČUJE SE PRIMENA NEKOG OD SLEDEĆIH INSEKTICIDA:

PREPARAT	AKTIVNAMATERIJA	DOZA
CIPKORD 20 EC, CIPRAZOR 20 EC, CRNA MAMBA	CIPERMETRIN	0,015 - 0,03%

.....
POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I POŠTOVANI GLEDAOCI, DETALJNIJE INFORMACIJE O POJAVI ŠETNIH ORGANIZAMA I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI NA SAJTU PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE
WWW.PISVOJVODINA.COM