

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI DOBRO DOŠLI U „ZELENU PROGNOZU“
DANAS VAS INFORMIŠEMO O SPROVOĐENJU JOŠ JEDNOG TRETMANA U CILJU SUZBIJANJA
CIKADA U VINOVOJ LOZI

.....

FAZA RAZVOJA

NA PODRUČJU VOJVODINE, U ZAVISNOSTI OD SORTIMENTA I REGIONA, VINOVA LOZA SE
NALAZI U FAZI OD POČETKA DO POTPUNOG DODIRIVANJA BOBICA.



SLIKA 1. FAZA RAZVOJA VINOVE LOZE

CIKADA *Scaphoideus titanus*

CIKADA *Scaphoideus titanus* JE VEOMA ZNAČAJNA ŠTETOČINA VINOVE LOZE. DIREKTNE
ŠTETE KOJE OVA CIKADA NANOSI VINOVOJ LOZI USLED ISHRANE SU ZANEMARLJIVE, ALI JE
EKONOMSKI VEOMA ZNAČAJNA KAO VEKTOR FITOPLAZME KOJA PROUZROKUJE **ZLATASTO
ŽUTILO VINOVE LOZE.**

ZLATASTO ŽUTILO VINOVE LOZE JE VEOMA DESTRUKTIVNO OBOLJENJE KOJE JE DOVELO DO
KRČENJA VELIKOG BROJA ZASADA U NAŠOJ ZEMLJI. LASTARI ZARAŽENIH BILJAKA IMAJU
SKRAĆENJE INTERNODIJE, NEDOVOLJNO ODRVENJAVAJU I IZMRZAVAJU U TOKU ZIME. NA
ZARAŽENIM ČOKOTIMA DOLAZI DO SAVIJANJA LISTOVA PO OBODU PREMA NALIČJU I DO
PROMENE NJIHOVE BOJE. KOD CRVENIH SORTI INFICIRANI LISTOVI SU TAMNOLJUBIČASTI
DO SVETLOCRVENI, A KOD BELIH SORTI SVETLOŽUTI DO ZLATNOŽUTI. ČESTO DOLAZI I DO

NEKROZE CVASTI, PA NE DOLAZI DO FORMIRANJA GROZDA ILI SU ONI REHULJAVI I LOŠIJEG KVALITETA.



SLIKA 2. SIMPTOM ZLATASTOG ŽUTILA VINOVE LOZE




SLIKA 3. SIMPTOM ZLATASTOG ŽUTILA VINOVE LOZE

PRE DESET DANA INFORMISALI SMO VAS O POČETKU POJAVE LARVI TREĆEG RAZVOJNOG STUPNJA CIKADE *Scaphioideus titanus* U VINOGRADIMA I MERAMA ZA NJIHOVO SUZBIJANJE. TRENUTNO SE VIZUELIM PREGLEDIMA VINOGRADA REGISTRUJE DOMINANTNO PRISUSTVO LARVI TREĆEG UZRASNOG STUPNJA OVE ŠTETOČINE.



SLIKA 4. CIKADA TREĆEG RAZVOJNOG STUPNJA *Scaphoideus titanus* NA NALIČJU LISTA



SLIKA 5. CIKADA TREĆEG RAZVOJNOG STUPNJA *Scaphoideus titanus* NA NALIČJU LISTA

PREPORUKA

SADA JE PRAVI MOMENAT ZA IZVOĐENJE DRUGOG INSEKTICIDNOG TRTEMANA ZA SUZBIJANJE CIKADE *Scaphoideus titanus* RADI POSTIZANJA DUGOROČNE ZAŠTITE PROIZVODNJE GROŽĐA.

S OBZIROM DA SE U VINOGRADIMA I DALJE REGISTRUJE PRISUSTVO LARVI CIKADA VEKTORA ZLATASTOG ŽUTILA VINOVE LOZE, NEOPHODNO JE PONOVI INSEKTICIDNI TRETMAN NEKIM OD REGISTROVANIH PREPARATA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	KONCENTRACIJA
FURY 10 EC	ZETA-CIPERMETRIN	0,01-0,015%
TODOME 24-SC	BUPROFEZIN+FENPIROKSIMAT	0,1%
ELISA	BUPROFEZIN	0,06%

U TOKU JE I POČETAK PILJENJA LARVI PEPELJASTOG GROŽĐANOG MOLJCA (*Lobesia botrana*). NAVEDENI INSEKTICIDI DELOVAĆE I NA SUZBIJANJE OVE ŠTETOČINE.

PORED SUZBIJANJA CIKADE, MERE KONTROLE ZLATOSTOG ŽUTILA SU I STALNI SANITARNI PREGLEDI ZASADA, OBAVEZNO UKLANJANJE OBOLELIH ČOKOTA, UNIŠTAVANJE DIVLJE LOZE U OKRUŽENJU PROIZVODNIH ZASADA, UNIŠTAVANJE KOROVA I UNIŠTAVANJE I KRČENJE NAPUŠTENIH ZASADA VINOVE LOZE.

PORED SUZBIJANJA ŠTETOČINA TREBA NASTAVITI I SA ZAŠTITOM OD PROUZROKOVAČA BOLESTI. DRTALJNIJE INFORMACIJE O MERAMA ZAŠTITE MOŽETE POGLEDATI NA PORTALU PROGNOZNO-IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE.

.....
POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I POŠTOVANI GLEDAOCI, DETALJNIJE INFORMACIJE O POJAVI ŠTETNIH ORGANIZAMA I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI NA SAJTU PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE
WWW.PISVOJVODINA.COM