

## Zelena prognoza za 7.5.2019. - O STANJU U ZASADIMA ŠLJIVA

### FENOFAZE ŠLJIVA

NA PODRUČJU VOJVODINE ŠLJIVE SE NALAZE U FENOFAZI OD DRUGOG OPADANJA PLODOVA DO PLODOVI OKO POLOVINE KRAJNJE VELIČINE.



SLIKA1-FAZA RAZVOJA ŠLJIVA

### ŠLJIVIN SMOTAVAC (*Grapholita funebrana*)


ŠLJIVIN SMOTAVAC JE NAJZNAČAJNIJA ŠTETOČINA ŠLJIVE KOJA U NAŠIM PROIZVODNIM USLOVIMA RAZVIJA TRI GENERACIJE GODIŠNJE.

ŠTETE PRIČINJAVAJU LARVE KOJE SE HRANE MESOM PLODA. NAPADNUTI PLODOVI SE PREPOZNAJU PO SMOLOTOČINI KOJA CURI IZ NJIH, PO TAMNIM HODNICIMA U KOJIMA SE NALAZI GUSENIČNI IZMET I PO TOME ŠTO DOLAZI DO PREVREMENOG SAZREVANJA I OPADANJA PLODOVA.

VIZUELNIM PREGLEDIMA ZASADA ŠLJIVA REGISTROVANA SU JAJA SVIH RAZVOJNIH STADIJUMA KAO I TEK ISPIJENE LARVE. U TOKU JE PILJENJE LARVI PRVE GENERCIJE OVE ŠTETOČINE.



SLIKA 2. POLOŽENA JAJA ŠLJIVINOG SMOTAVCA NA PLODU



SLIKA 3. SVEŽE POLOŽENO JAJE ŠLJIVINOG SMOTAVCA NA PLODU

#### PREPORUKA

U CILJU SPREČAVANJA UBUŠIVANJA LARVI ŠLJIVINOG SMOTAVCA U PLODOVE, PREPORUČUJU SE HEMIJSKE MERE ZAŠTITE NEKIM OD REGISTROVANIH INSEKTICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	KONCENTRACIJA
PYRINEX 25 SC	HLORPIRIFOS	0,25%
GROM	LAMBDA-CIHALOTRIN	0,03%

#### ŠUPLJIKAVOST LIŠĆA KOŠTIČAVOG VOĆA (*Stigmia carpophila*)

GLJIVA, PROUZROKOVAČ ŠUPLJIKAVOSTI, NAPADA LIŠĆE, PLODOVE, LASTARE, PUPOLJKE I CVETOVE KOŠTIČAVOG VOĆA. NA LISTU, PEGE SU U POČETKU SITNE, CRVENKASTOSMEĐE ILI SIVOLJUBIČASTE, OVIČENE USKOM ZONOM SVETLOZELENE ILI ŽUTE BOJE. PEGE SE VREMENOM POVEĆAVAJU, TKIVO U OKVIRU PEGA NEKROTIRA I ISPADA, PA NA LISTU NASTAJU ŠUPLJINE. ZARAŽENO LIŠĆE OPADA PRE VREMENA.

## PREPORUKA

U CILJU ZAŠTITE ZASADA ŠLJIVA OD NAVEDENOG PATOGENA PREPORUČUJE SE PRIMENA FUNGICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	KONCENTRACIJA
CAPTAN 50 WP, MERPAN 50 WP, METOD 480 SC, CAPI	KAPTAN	0,2 – 0,3%