


STANJE U ZASADIMA KOŠTIČAVOG VOĆA

FAZE RAZVOJA KOŠTIČAVOG VOĆA

NA PODRUČJU VOJVODINE, KOŠTIČAVO VOĆE SE NALAZI U RAZLIČITIM FAZAMA RAZVOJA PUPOLJAKA U ZAVISNOSTI OD REGIONA, EKSPozICIJE TERENA I SORTIMENTA. ŠLJIVE SE NALAZE U FAZI OD MIROVANJA DO POČETKA BUBRENJA LISNIH PUPOLJAKA. VIŠNJE I TREŠNJE SE NALAZE U FAZI OD POČETKA DO KRAJA BUBRENJA LISNIH PUPOLJAKA. KAJSIJE SE NALAZE U FAZI OD MIROVANJA DO BUBRENJA CVETNIH PUPOLJAKA. BRESKVE I NEKTARINE SU U NAJODMAKLIJIM FAZAMA RAZVOJA, TE SE SORTE RANIH GRUPA ZRENJA NALAZE U FAZI ZELENI USKI LISTIĆI VIDLJIVI DOK SE SORTE KASNIH GRUPA ZRENJA NALAZE U FAZI KRAJ BUBRENJA LISNIH PUPOLJAKA.



SLIKA 1. FAZE RAZVOJA KOŠTIČAVOG VOĆA

KOVRDŽAVOST LISTA BRESKVE I NEKTARINE (*Taphrina deformans*)

U FAZI BUBRENJA I OTVARANJA PUPOLJAKA BRESKVE I NEKTARINE, MOŽE DOĆI DO INFEKCIJE MLADIH LISTOVA I CVETNIH PUPOLJAKA GLJIVOM KOJA PROUZROKUJE KOVRDŽAVOST LISTA.

OVO JE NAJZNAČAJNIJA BOLEST BRESAKA I NEKTARINA. MOŽE DA NANESE VELIKE ŠTETE ZASADIMA, KAO ŠTO SU PROPADANJE ZARAŽENOG LISTA I PLODA, SMANJENJE RODNOSTI U NAREDNOJ GODINI A ZARAŽENA STABLA SU OSETLJIVIJA NA NAPAD DRUGIH ŠTETNIH ORGANIZAMA I KRAĆEG SU ŽIVOTNOG VEKA. ZARAŽENO LIŠĆE JAKO ZADEBLJA, DEFORMIŠE SE, NABORA I ISKOVRDŽA, PA OTUDA I SAM NAZIV BOLESTI-KOVRDŽAVOST.

OVA GLJIVA OSTVARUJE SAMO PRIMARNE INFEKCIJE I TO U PERIODU KADA JE BRESKVA NAJOSETLJIVIJA, **OD BUBRENJA DO OTVARANJA PUPOLJAKA.**

PRISUSTVO KIŠE I TEMPERATURE VAZDUHA IZNAD 8⁰C SU USLOVI PRI KOJIMA DOLAZI DO INFEKCIJE.

PREPORUKA

U ZASADIMA BRESKVE I NEKTARINE KOJI SE NALAZE U FAZI BUBRENJA I OTVARANJA LISNIH PUPOLJAKA NEOPHODNO JE IZVRŠITI MERE ZAŠTITE. POSEBNU PAŽNJU TREBA OBRATITI NA PUPOLJKE KOJI SE NALAZE U DONJEM DELU KROŠNJE KOJI KASNIJE KREĆU OD PUPOLJAKA IZ GORNJIH DELOVA KROŠNJE. PREPORUČUJE SE PRIMENA NEKOG OD SLEDEĆIH FUNGICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	KONCENTRACIJA
DELAN 700-WG	DITIANON	0,1%
SYLLIT	DODIN	0,15-0,25%
FITOCIRAM 75 S	CIRAM	0,35%

U ZASADIMA ŠLJIVA, VIŠANJA, TREŠANJA I KAJSIJA KOJI SE NALAZE U FENOFAZAMA OD MIROVANJA DO KRAJA BUBRENJA PUPOLJAKA PREPORUČUJE SE PRIMENA PREPARATA PROTIV PREZIMLUJUĆIH FORMI PATOGENA (PROUZOKOVAČA ŠUPLJIKAVOSTI LISTA KOŠTIČAVOG VOĆA-*Stigmina carpophila* I PROUZROKOVAČA SUŠENJA CVETOVA I GRANČICA-*Monilia laxa*). PREPORUČUJE SE PRIMENA PREPARATA NA BAZI BAKRA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	KONCENTRACIJA
BAKAR OKSIHLORID -50	BAKAR OKSIHLORID	0,75%