

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI DOBRO DOŠLI U „ZELENU PROGNOZU“

DANAS VAS INFORMIŠEMO O ZDRAVSTENOM STANJU USEVA OZIME PŠENICE NA POLJIMA VOJVODINE

.....

FENOFAZE RAZVOJA OZIME PŠENICE

USEVI OZIME PŠENICE SE, U ZAVISNOSTI OD VREMENA SETVE I PRIMENJENIH AGROTEHNIČKIH MERA, NALAZE U RAZLIČITIM FAZAMA BOKORENJA, U JEDNOM BOKORU JE PRISUTNO OD DVA DO DEVET SEKUNDARNIH STABALA.



SLIKA 1. USEV OZIME PŠENICE



SLIKA 2. USEV OZIME PŠENICE

ZDRAVSTVENO STANJE USEVA OZIMKE PŠENICE

U OKVIRU RADA PROGNOZNO-IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE, OD NICANJA PŠENICE SE REDOVNO VRŠE VIZUELNI PREGLEDI USEVA NA PRISUSTVO SIMPTOMA BOLESTI I ŠTETOČINA. NA OSNOVU NAJNOVIJIH PREGLEDA, UTVRĐENO JE PRISUSTVO SIMPTOMA DVA OBOLJENJA: SIVE PEGAVOSTI LISTA PŠENICE I PEPELNICE ŽITA.



SLIKA 3. SIMPTOMI SIVE PEGAVOSTI LISTA PŠENICE



SLIKA 4. SIMPTOMI SIVE PEGAVOSTI LISTA PŠENICE



SLIKA 5. SIMPTOM SIVE PEGAVOSTI LISTA PŠENICE

SIMPTOMI SIVE PEGAVOSTI LISTA PŠENICE SU PRISUTNI NA VELIKOM BROJU PARCELA. KOD OSETLJIVOG SORTIMENTA, OVE GODINE SE REGISTRUJE ZNATNO VEĆI PROCENAT ZARAŽENIH BILJAKA U ODNOSU NA PROŠLU GODINU KOJI IDE ČAK I DO 70%. NAJVEĆI PROCENAT ZARAŽENIH BILJAKA JE UOČEN U NAJRAZVIJENIJIM USEVIMA PŠENICE IZ NAJRANIJIH ROKOVA SETVE. MEĐUTIM, U POJEDINIM USEVIMA NIJE UOČENO PRISUSTVO SIMPTOMA, TAKO DA NA NIVO PRISUSTVA OVOG PATOGENA ZNAČAJAN UTICAJ IMAJU SORTIMENT, ROK SETVE, GUSTINA BILJNOG SKLOPA I PRIMENJENE AGROTEHNIČKE MERE.



Pepelnica žita (*Erysiphe graminis*)

SLIKA 6. SIMPTOM PEPELNICE ŽITA



SLIKA 7. SIMPTOMI PEPELNICE ŽITA

SIMPTOMI PEPELNICE ŽITA SU PRISUTNI NA UOBIČAJENOM NIVOU. NAJVEĆI PROCENAT BILJAKA SE REGISTRUJE U USEVIMA SA GUSTIM SKLOPOM BILJAKA.

NA OSNOVU TRENUTNO REGISTROVANOG INTENZITETA PRISUSTVA BILJNIH BOLESTI U USEVIMA PŠENICE, MOŽE SE OČEKIVATI DA ĆE PO ULASKU PŠENICA U FAZE RASTA STABLA, VRLO BRZO DOĆI I DO POSTIZANJA PRAGOVA ŠTETNOSTI PRISUSTVA PATOGENA U USEVIMA, TE JE PREPORUKA DA SE USEVI REDOVNO OBILAZE I PRATI NJIHOVO ZDRAVSTVENO STANJE.

TAKOĐE, TOKOM PREGLEDA NA PRISUSTVO SIMPTOMA BILJNIH BOLESTI, TREBA OBRATITI PAŽNJU I NA PRISUSTVO AKTIVNIH RUPA OD GLODARA. IAKO OVE ZIME NIJE UOČEN JAK NAPAD GLODARA U USEVIMA OZIMIH STRNINA, NA POJEDINIM LOKALITETIMA JE BILO POTREBE DA SE IZVRŠI NJIHOVO SUZBIJANJE. REDOVNE PREGLEDE TREBA NASTAVITI I UKOLIKO SE USTANOVI PRISUSTVO OD 10 DO 50 AKTIVNIH RUPA PO HEKTARU OD POLJSKOG MIŠA ILI OD 10 DO 500 AKTIVNIH RUPA OD POLJSKE VOLUHARICE PREPORUKA JE

DA SE PRIMENE RODENTICIDI I TO GOTOVI MAMCI KOJE OBAVEZNO TREBA ZATRPATI DA NE BI DOŠLO DO TROVANJA DIVLJAČI.



SLIKA 8. RUPA OD GLODARA (POLJSKE VOLUHARICE) U USEVU PŠENICE

.....
POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI, DETALJNIJE INFORMACIJE O POJAVI ŠTETNIH ORGANIZAMA I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI NA SAJTU PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE WWW.PISVOJVODINA.COM