

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI DOBRO DOŠLI U „ZELENU PROGNOZU“  
DANAS VAS INFORMIŠEMO O STANJU U ZASADIMA JABUKA

---

## FENOFAZE JABUKA

NA PODRUČJU VOJVODINE JABUKE SE NALAZE U RAZLIČITIM FENOFAZAMA, OD FAZE FORMIRANIH CRVENIH PUPOLJAKA DO FAZE PUNOG CVETANJA.



SLIKA 1. FAZA JABUKE

## PEPELNICA JABUKE (*Podosphaera leucotricha*)

U ZASADIMA JABUKA REGISTRUJE SE PRISUSTVO SIMPTOMA PEPELNICE U VIDU BELIH MLADARA. TO SU MLADARI KOJI SU SE RAZVILI IZ ZARAŽENIH PUPOLJAKA IZ PRETHODNE VEGETACIJE. LIŠĆE IM JE ZAKRŽLJALO I PREKRIVENO BELOM MASOM KONIDIJA GLJIVE, A CVETOVİ SU SITNI I OSTAJU ZATVORENI.

USLOVI U KOJIMA SE NALAZIMO SU VEOMA POVOLJNI ZA DALJI RAZVOJ OVOG PATOGENA, A TO SU RELATIVNA VLAŽNOST VAZDUHA VIŠA OD 60% I TEMPERATURE OD 15 DO 25°C.



SLIKA 2. SIMPTOMI PEPELNICE JABUKE – BELI MLADAR



SLIKA 3. SIMPTOMI PEPELNICE JABUKE – BELI MLADAR

## PREPORUKA

U ZASADIMA GDE SE REGISTRUJE PRISUSTVO BELIH MLADARA PREPORUČUJE SE NJIHOVO MEHANIČKO UKLANJANJE RADI SMANJENJA INFEKTIVNOG POTENCIJALA PATOGENA I SPREČAVANJA SEKUNDARNIH INFEKCIJA. KOD SORATA OSETLJIVIH NA PEPELNICU JABUKE KAO ŠTO SU AJDARED, JONAGOLD, JONATAN, RED JONAPRINS I DRUGE, PREPORUČUJE SE PRIMENA NEKOG OD SLEDEĆIH FUNGICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA/KONCENTRACIJA
KOSSAN-WG, KUMULUS-DF, WETSUL	SUMPOR	0,3-0,5%

## ČAĐAVA PEGAVOST LISTA I KRSTAVOST PLODOVA JABUKE (*Venturia inaequalis*)


PERIOD PRIMARNIH INFEKCIJA OD NAJZNAČAJNIJEG PATOGENA U PROIZVODNJI JABUKA, OD PROUZROKOVAČA ČAĐAVE PEGAVOSTI LISTA I KRSTAVOSTI PLODOVA JABUKE, JE U TOKU. PROCES PRAŽNJENJA PSEUDOTECIJA ODNOSNO OSLOBAĐANJA ASKOSPORA JE NA SAMOM POČETKU TAKO DA SE U JABUČNJACIMA REGISTRUJE VISOK NIVO INFEKTIVNOG MATERIJALA OVOG PATOGENA. SA SVAKIM PADAVINAMA MOŽE SE OČEKIVATI OSLOBAĐANJE VELIKOG BROJA ASKOSPORA I VISOK RIZIK OD INFEKCIJA PROUZROKOVAČEM ČAĐAVE PEGAVOSTI LISTA I KRSTAVOSTI PLODOVA JABUKE.

## PREPORUKA

U ZAŠTITI JABUKA OD OVOG PATOGENA OD KLJUČNOG ZNAČAJA JE PROGNOZA PADAVINA. NAJBOLJA STRATEGIJA JE PREVENTIVNA ZAŠTITA TJ. PRIMENA KONTAKTNIH FUNGICIDA PRED NAJAVLJENE PADAVINE.

S OBZIROM NA TRENUTNU PROGNOZU PO KOJOJ SE PRVE PADAVINE OČEKUJU POČETKOM SLEDEĆE NEDELJE, PRE TOGA SE PREPORUČUJE PRIMENA NEKOG OD PREVENTIVNIH FUNGICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA/KONCENTRACIJA
MANKOGAL-80 ILI DITHANE M-45	MANKOZEB	0,25%



SLIKA 4. PSEUDOTECIJA SA ASKOSPORAMA *Venturia inaequalis*



SLIKA 5. ČAĐAVA PEGAVOST LISTA JABUKE



SLIKA 6. ČAĐAVA KRSTAVOST PLODA JABUKE

.....  
POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I POŠTOVANI GLEDAOCI, DETALJNIJE  
INFORMACIJE O POJAVI ŠTETNIH ORGANIZAMA I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI  
NA SAJTU PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE  
[WWW.PISVOJVODINA.COM](http://WWW.PISVOJVODINA.COM)