

O BRESKVINOM SMOTAVCU

BRESKVIN SMOTAVAC (*Cydia molesta*)

BRESKVIN SMOTAVAC JE VEOMA ZNAČAJNA ŠTETOČINA U PROIZVODNJI VOĆA NA NAŠIM PROSTORIMA. NAJVEĆE ŠTETE PRIČINJAVA U ZASADIMA BRESAKA I NEKTARINA, A MOŽE PROUZROKOVATI ŠTETE I NA ŠLJIVAMA, KAJSIJAMA, JABUKAMA, KRUŠKAMA I DUNJAMA.

ŠTETE PRIČINJAVAJU LARVE KOJE SE UBUŠUJU U VRHOVE LASTARA ILI U PLODOVE. LARVE BRESKVINOG SMOTAVCA SE UBUŠUJU PRI VRHU SOČNIH, JOŠ NEZDRVENJENIH LASTARA. BUŠEĆI HODNIK KROZ SREDINU, LARVA SE KREĆE NIZ LASTAR A NA ULAZNI OTVOR IZBACUJE CRVOTOČINU. JEDNA LARVA MOŽE DA OŠTETI VIŠE LASTARA KOJI NAJPRE VENU, A POTOM ŽUTE I SUŠE SE.

LARVE SE UBUŠUJU I U UNUTRAŠNJOST PLODOVA. NA MESTU ULAZA MOŽE SE VIDETI SMOLOTOČINA KOJA CURI IZ PLODA I TAKVI PLODOVI OTPADAJU PRE VREMENA.



SLIKA 1. SIMPTOM OŠTEĆENJA OD LARVE BRESKVINOG SMOTAVCA NA LASTARU

PRISUSTVO OVE ŠTETOČINE U PLODOVIMA VOĆA MOŽE DA OGRANIČI IZVOZ, JER JE BRESKVIN SMOTAVAC KARANTINSKA ŠTETOČINA U NEKIM ZEMLJAMA GDE SE IZVOZI NAŠE VOĆE.

U NAŠIM PROIZVODNIM USLOVIMA BRESKVIN SMOTAVAC RAZVIJA TRI DO ČETIRI GENERACIJE GODIŠNJE, U ZAVISNOSTI OD REGIONA.

POČETAK LETA LEPTIRA PRVE GENERACIJE NA PODRUČJU VOJVODINE ZABELEŽEN JE KRAJEM MARTA I OD TADA SE BELEŽE KONTINUIRANI ULOVI ODRASLIH JEDINKI.



SLIKA 2. IMAGO BRESKVINOG SMOTAVCA

VIZUELNIM PREGLEDIMA ZASADA BRESAKA I NEKTARINA REGISTRUJE SE PRISUSTVO POLOŽENIH JAJA OVE ŠTETOČINE NA NALIČJU LISTOVA KAO I PRISUSTVO ISPILJENIH LARVI. U TOKU JE POČETAK PILJENJA LARVI PRVE GENERACIJE BRESKVINOG SMOTAVCA.



SLIKA 3. JAJE BRESKVINOG SMOTAVCA NA NALIČJU LISTA

PREPORUKA

S OBZIROM DA SE NA CELOM PODRUČJU VOJVODINE REGISTRUJE PILJENJE LARVI PRVE GENERACIJE BRESKVINOG SMOTAVCA NEOPHODNO JE PRIMENITI HEMIJSKE MERE ZAŠTITE. U TU SVRHU PREPORUČUJE SE PRIMENA SLEDEĆEG INSEKTICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	KONCENTRACIJA
PYRINEX 25 CS	HLORPIRIFOS	0,25%