

O STANJU U ZASADIMA VINOVE LOZE

FENOFAZE VINOVE LOZE

NA PODRUČJU VOJVODINE VINOVA LOZA SE NALAZI U FAZI OD KRAJA CVETANJA DO BOBICE VELIČINE ZRNA PŠENICE.



SLIKA 1. FAZA RAZVOJA VINOVE LOZE, SORTA CRNI BURGUNDAC

PLAMENJAČA VINOVE LOZE (*Plasmopara viticola*)

U PRETHODNIM EMISIJAMA OBAVEŠTAVALI SMO VAS O POVOLJNIM USLOVIMA ZA RAZVOJ GLJIVE KOJA PROUZROKUJE PLAMENJAČU VINOVE LOZE I O MERAMA ZAŠTITE KOJE JE BILO POTREBNO SPROVESTI. U NEADEKVATNO ŠTIĆENIM ZASADIMA REGISTRUJE SE PRISUSTVO SIMPTOMA OVOG PATOGENA.

USLOVI ZA ŠIRENJE PLAMENJAČE VINOVE LOZE SU I DALJE VEOMA POVOLJNI I UKOLIKO DOĐE DO INFEKCIJE U OVIM FAZAMA RAZVOJA VINOVE LOZE, CEO PRINOS MOŽE BITI UGROŽEN.



SLIKA 2. SIMPTOM PLAMENJAČE NA LISTU

PEPELNICA VINOVE LOZE (*Uncinula necator*)

NA OSETLJIVIM SORTAMA POPUT FRANKOVKE MOGU SE UOČITI SIMPTOMI PEPELNICE NA LISTU, A NA NALIČJU LISTA NALAZI SE BELIČASTA NAVLAKA OD SPORONOSNIH ORGANA GLJIVE.

U USLOVIMA POVOLJNIM ZA NJEN RAZVOJ, PEPELNICA MOŽE BITI VEOMA ŠTETNO OBOLJENJE I VODI KA SMANJENJU PRINOSA.



SLIKA 3. SIMPTOM PEPELNICE NA LISTU (NALIČJE LISTA)

PREPORUKA

ZBOG VEOMA KRITIČNE SITUACIJE U KOJOJ SE TRENUTNO NALAZIMO, A TO JE PRISUSTVO PATOGENA U ZASADIMA, POVOLJNI USLOVI ZA NJIHOVO DALJE ŠIRENJE I OSETLJIVA FAZA VINOVE LOZE, NEOPHODNO JE IZVRŠITI HEMIJSKU ZAŠTITU VINOGRADA SA SLEDEĆOM KOMBINACIJOM FUNGICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	KONCENTRACIJA/DOZA
RIDOMIL GOLD MZ 68-WG	MANKOZEB+METALAKSIL-M	2,5 KG/HA
+		
POSTALON 90 SC	MIKLOBUTANIL+KVINOKSIFEN	1,25 L/HA

CIKADA *Scaphoideus titanus*

CIKADA *Scaphoideus titanus* JE VEOMA ZNAČAJNA ŠTETOČINA VINOVE LOZE. DIREKTNE ŠTETE KOJE OVA CIKADA NANOSI VINOVOJ LOZI USLED ISHRANE SU ZANEMARLJIVE, ALI JE EKONOMSKI VEOMA ZNAČAJNA KAO VEKTOR FITOPLAZME KOJA PROUZROKUJE ZLATASTO ŽUTILO VINOVE LOZE. OVO JE VEOMA DESTRUKTIVNO OBOLJENJE VINOVE LOZE KOJE JE DOVELO DO KRČENJA VELIKOG BROJA ZASADA U NAŠOJ ZEMLJI.



SLIKA 4. LARVA CIKADE *Scaphoideus titanus* NA NALIČJU LISTA VINOVE LOZE

MERE ZAŠTITE I PREVENCIJE PROTIV OVOG ZNAČAJNOG OBOLJENJA PODRAZUMEVAJU:

1. STALNE SANITARNE PREGLEDE ZASADA
2. OBAVEZNO UKLANJANJE OBOLELIH ČOKOTA
3. **SUZBIJANJE VEKTORA, PRENOSIOCA FITOPLAZME – CIKADE *Scaphoideus titanus***
4. UNIŠTAVANJE DIVLJE LOZE U OKRUŽENJU PROIZVODNIH ZASADA
5. UNIŠTAVANJE KOROVA
6. UNIŠTAVANJE I KRČENJE NAPUŠTENIH ZASADA VINOVE LOZE

PREPORUKA-SUZBIJANJE VEKTORA

U VINOGRADIMA JE DOMINANTNO PRISUSTVO LARVI CIKADA TREĆEG RAZVOJNOG STADIJUMA, TE JE NEOPHODNO IZVRŠITI NJIHOVO SUZBIJANJE. SADA JE PRAVI MOMENAT ZA PRIMENU INSEKTICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	KONCENTRACIJA
TODOME 24-SC	BUPROFEZIN+FENPIROKSIMAT	0,1%
ELISA	BUPROFEZIN	0,06%