

## O potrebi sprovođenja mera zaštite u usevima šećerne repe

---

### FAZE ŠEĆERNE REPE

NA PODRUČJU VOJVODINE USEVI ŠEĆERNE REPE NALAZE SE U FAZI RAZVIĆA KORENA.



SLIKA1-USEV ŠEĆERNE REPE I SIMPTOMI PEGAVOSTI LISTA

### PEGAVOST LISTA ŠEĆERNE REPE (*Cercospora beticola*)

PEGAVOST LISTA ŠEĆERNE REPE JAVLJA SE SVAKE GODINE NA NAŠEM PROIZVODNOM PODRUČJU I UTIČE NA PRINOS KORENA I SADRŽAJ ŠEĆERA.

U BORBI PROTIV OVE BOLESTI NAJŠIRE SU UKLJUČENE HEMIJSKE MERE ZAŠTITE. U POSLEDNJIH DESETAK GODINA UKLJUČUJU SE I SORTE RAZLIČITOG NIVOVA TOLERANCIJE PREMA OVOM PATOGENU. TAKOĐE, USLOVI U KOJIMA SE ODVIJA PROIZVODNJA REPE IMAJU ZNAČAJNU ULOGU U RAZVOJU OVE GLJIVE. SVE OVE OKOLNOSTI DOVODE DO DIFERENCIRANOG PRISTUPA U ZAŠTITI ŠEĆERNE REPE OD PROUZROKOVAČA PEGAVOSTI LISTA.

SISTEM PROGNOZE DAO JE SIGNAL ZA PRVI TRETMAN U USEVIMA ŠEĆERNE REPE ZA SUZBIJANJE PEGAVOSTI LISTA I TO U DVA NAVRATA.

16. JUNA INFORMISALI SMO VAS PRVI PUT O POSTIZANJU PRVOG EPIDEMIJSKOG PRAGA OVOG OBOLJENJA NA MANJEM BROJU PARCELA I TO UGLAVNOM NA USEVIMA IZ NAJRANIJIH ROKOVA SETVE ILI SA OSETLJIVIM SORTIMENTOM ILI SA UČESTALIM GAJENJEM ŠEĆERNE REPE. NA TIM USEVIMA NAKON ISTEKA PERZISTENCIJE PREPARATA, U PERIODU OD 26 DO 28 JUNA STEKLI SU SE USLOVI ZA NOVE INFEKCIJE KOJE SU SE I REALIZOVALE. TRENUTNO SU NA TIM PARCELAMA PRISUTNI SIMPTOMI PEGAVOSTI LISTA NA NIVOU DRUGOG EPIDEMIJSKOG PRAGA, ODNOSNO REGISTRUJE SE 25% LISTOVA SA 3 DO 5 PEGA.

23. JUNA INFORMISALI SMO VAS DRUGI PUT O POSTIZANJU PRVOG EPIDEMIJSKOG PRAGA I TO NA VEĆINI PARCELA POD REPOM. MEĐUTIM, NA TAKVIM PARCELAMA, SVEGA NEKOLIKO DANA NAKON TRETMANA PALA JE ZA VEOMA KRATKO VREME VELIKA KOLIČINA PADAVINA KOJA JE DOVELA DO SPIRANJA KONTAKTNOG FUNGICIDA. U REGIONU BAČKE ZA SAMO NEKOLIKO SATI PALO JE PREKO 30 LITARA KIŠE, A NA POJEDINIM LOKALITETIMA BELEŽI SE I PREKO 20 LITARA U JEDNOM SATU. NA TAKVIM PARCELAMA PRIBLIŽAVAMO SE DRUGOM EPIDEMIJSKOM PRAGU KADA JE NEOPHODNO SPROVOĐENJE DRUGOG TRETMANA PROTIV PEGAVOSTI LISTA ŠEĆERNE REPE.



SLIKA2-SIMPTOM PEGAVOSTI LISTA ŠEĆERNE REPE

### PREPORUKA

PREPORUČUJE SE PROIZVOĐAČIMA OBILAZAK USEVA ŠEĆERNE REPE I REGISTROVANJE SIMPTOMA PEGAVOSTI LISTA.

**UKOLIKO SE REGISTRUJE PRISUSTVO PEGA NA 25% LISTOVA, A PROSEČAN BROJ PEGA SE KREĆE OD 3 DO 5, PREPORUČUJE SE ZAŠTITA USEVA PRIMENOM REGISTROVANIH FUNGICIDA.**

ZAŠTITU USEVA NEOPHODNO JE SPROVESTI KOMBINACIJOM FUNGICIDA SA PREVENTIVNIM I SISTEMIČNIM MEHANIZMOM DELOVANJA:

PREPARATI	AKTIVNA MATERIJA	DOZA
BRAVO ILI DAKOFLO +	HLOROTALONIL	1,5-2 L/HA
AMISTAR EXTRA	AZOKSISTROBIN+CIPROKONAZOL	0,75 L/HA
BRAVO ILI DAKOFLO +	HLOROTALONIL	1,5-2 L/HA
ACANTO PLUS	PIKOKSISTROBIN+CIPROKONAZOL	0,8 L/HA
BRAVO ILI DAKOFLO +	HLOROTALONIL	1,5-2 l/HA
DUETT ULTRA	EPOKSIKONAZOL+TIOFANAT-METIL	0,6 L/HA
BRAVO ILI DAKOFLO +	HLOROTALONIL	1,5-2 l/HA

PROPULSE	FLUOPIRAM+PROTIKONAZOL	1,2 L/HA
----------	------------------------	----------

---