

Zelena prognoza za 8.7.2019. - O BRESKVINOM SMOTAVCU, VEOMA ZNAČAJNOJ ŠTETOČINI VOĆA NA NAŠEM PODRUČJU

FENOFAZE BRESKVE

NA PODRUČJU VOJVODINE U TOKU JE BERBA SREDNJESTASNIH SORTI BRESAKA I NEKTARINA, DOK SE KASNE SORTE NALAZE U FAZI OD POČETKA OBOJAVANJA PLODA DO OBOJAVANJE PLODA SKORO ZAVRŠENO.



SLIKA 1. FAZA RAZVOJA NEKTARINE

BRESKVIN SMOTAVAC (*Cydia molesta*)

BRESKVIN SMOTAVAC JE VEOMA ZNAČAJNA ŠTETOČINA U PROIZVODNJI VOĆA NA NAŠIM PROSTORIMA. NAJVEĆE ŠTETE PRIČINJAVA U ZASADIMA BRESAKA I NEKTARINA, A MOŽE PROUZROKOVATI ŠTETE I NA ŠLJIVAMA, KAJSIJAMA, JABUKAMA, KRUŠKAMA I DUNJAMA.

ŠTETE PRIČINJAVAJU LARVE KOJE SE UBUŠUJU U VRHOVE LASTARA ILI U PLODOVE.



SLIKA 2. LARVA BRESKVINOG SMOTAVCA U MLADARU

NA MESTU GDE SE LARVA UBUŠILA U PLOD MOŽE SE VIDETI SMOLOTOČINA KOJA CURI IZ NJEGA I TAKVI PLODOVI GUBE TRŽIŠNU VREDNOST I OTPADAJU PRE VREMENA.



SLIKA 3. UBUŠENJE NA PLODU NEKTARINE OD LARVE BRESKVINOG SMOTAVCA

PORED OVIH DIREKTNIH ŠTETA USLED ISHRANE LARVI, VEOMA ZNAČAJNE SU I INDIREKTNE ŠTETE KOJE PROUZROKUJE BRESKVIN SMOTAVAC. PRISUSTVO OVE ŠTETOČINE U PLODOVIMA VOĆA MOŽE DA OGRANIČI IZVOZ, JER JE BRESKVIN SMOTAVAC KARANTINSKA ŠTETOČINA U NEKIM ZEMLJAMA GDE SE IZVOZI NAŠE VOĆE.

U NAŠIM PROIZVODNIM USLOVIMA, BRESKVIN SMOTAVAC RAZVIJA ČETIRI GENERACIJE GODIŠNJE.

U TOKU JE POLAGANJE JAJA I POČETAK PILJENJA LARVI TREĆE GENERACIJE OVE ŠTETOČINE. NA NALIČJU LISTOVA REGISTRUJE SE PRISUSTVO JAJA SVIH RAZVOJNIH STADIJUMA.



SLIKA 4. JAJE BRESKVINOG SMOTAVCA PRED PILJENJE LARVE NA NALIČJU LISTA BRESKVE

PREPORUKA

U CILJU SPREČAVANJA UBUŠIVANJA LARVI U PLODOVE I MLADARE PROIZVOĐAČIMA SE PREPORUČUJE PRIMENA INSEKTICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	KONCENTRACIJA
CORAGEN 20 SC	Hlorantraniliprol	0,02%

PRILIKOM HEMIJSKE ZAŠTITE BRESAKA I NEKTARINA STROGO TREBA VODITI RAČUNA O KARENCI PRIMENJENIH PREPARATA KOJA ZA NAVEDENI INSEKTICID IZNOSI 14 DANA. U

**ZASADIMA U KOJIMA JE U TOKU ILI ĆE USKORO POČETI BERBA NIKAKO NE TREBA
PRIMENJIVATI HEMIJSKE MERE ZAŠTITE!**