

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI DOBRO DOŠLI U „ZELENU PROGNOZU“
DANAS VAS INFORMIŠEMO O STANJU U USEVIMA JEČMA

.....

FAZE RAZVOJA JEČMA

NA PODRUČJU VOJVODINE USEVI JEČMA SE, U ZAVISNOSTI OD DATUMA SETVE, LOKALITETA I SORTIMENTA NALAZE U FAZI OD KRAJA BOKORENJA DO FORMIRANOG PRVOG KOLENCA.

STANJE U USEVIMA JEČMA

VIZUELNIM PREGLEDIMA USEVA JEČMA REGISTROVANO JE PRISUSTVO SIMPTOMA SLEDEĆIH BOLESTI:

- MREŽASTA PEGAVOST LISTA JEČMA (*Pyrenophora teres*)
- PEPELNICA ŽITA (*Erysiphe graminis*)
- RĐA JEČMA (*Puccinia hordei*)
- SOČIVASTA PEGAVOST LISTA JEČMA (*Rhynchosporium secalis*)



SLIKA 1. SIMPTOM MREŽASTE PEGAVOSTI LISTA JEČMA



SLIKA 2. SIMPTOM SOČIVASTE PEGAVOSTI LISTA JEČMA



SLIKA 3. SIMPTOM PEPELNICE NA LISTU JEČMA



SLIKA 4. SIMPTOM RĐE NA LISTU JEČMA

NA PODRUČJU VOJVODINE, TRENUTNI NIVO ZARAŽENOSTI NAVADENIM PATOGENIMA JE RAZLIČIT U ZAVISNOSTI OD REGIONA, SORTIMENTA, UZRASTA I SKLOPA BILJAKA, PREDUSEVA I DR. GOTOVO DA NE POSTOJI PARCELA JEČMA GDE NISU PRISUTNI SIMPTOMI BILJNIH BOLESTI I ZATO JE VEOMA VAŽNO SAČUVATI LISNU MASU I OMOGOĆUTI NEMETAN RAZVOJ BILJAKA JEČMA.

PROCENAT BILJAKA SA SIMPTOMIMA BOLESTI, PO REGIONIMA, PRIKAZAN JE U TABELI:

Regionalni centar PIS-a	Procenat biljaka sa simptomima bolesti (%)			
	Pepelnica žita	Mrežasta pegavost	Rđa ječma	Sočivasta pegavost
Bačka Topola	15-91	21-56	0-1	1-5
Novi Sad	10-90	16-30	0-8	0-2
Vrbas	85	32	15	0
Zrenjanin	18-25	12-21	0-1	0
Vršac	8-35	6-9	0	0-2
Ruma	3-42	13-32	0	3-8
Sremska Mitrovica	23	25	4	0
Sombor	6-9	9-14	4-7	0
Subotica	10-90	15-30	0	0
Senta	50	25-95	0	0
Pančevo	0-5	18-20	0	0

PREPORUKA

S OBZIROM NA VISOK NIVO PRISUSTVA SIMPTOMA BOLESTI U USEVIMA JEČMA U VEĆINI REGIONA I ULAZAK BILJAKA U OSETLJIVU FAZU, FAZU VLATANJA, NEOPHODNO JE REDOVNO OBILAZITI USEVE I PRATITI PRISUSTVO BOLESTI.

UKOLIKO SE U FAZI PRVOG KOLENCA REGISTRUJE 10% BILJAKA SA SIMPTOMIMA BOLESTI PREPORUČUJU SE HEMIJSKE MERE ZAŠTITE NEKIM OD REGISTROVANIH FUNGICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA
ANTRE PLUS	TEBUKONAZOL + TIOFANAT METIL	1,5 L/HA
DUETT ULTRA	EPOKSIKONAZOL + TIOFANAT METIL	0,4 – 0,6 L/HA
FALCON FORTE	TEBUKONAZOL+ PROTIKONAZOL+SPIROKSAMIN	0,7 – 1 L/HA
CUSTODIA	TEBUKONAZOL + AZOKSISTROBIN	0,8 L/HA
OPUS TEAM	FENPROPIMORF + EPOKSIKONAZOL	1 L/HA
AMISTAR EXTRA	AZOKSISTROBIN + CIPROKONAZOL	0,5 – 0,75 L/HA
TEATAR PLUS	AZOKSISTROBIN + DIFENOKONAZOL	0,6 – 1 L/HA
OPERA MAX	PIRAKLOSTROBIN + EPOKSIKONAZOL	1,2 – 2 L/HA

HEMIJSKE MERE ZAŠTITE TREBA SPROVESTI KADA TEMPERATURE VAZDUHA DOSTIGNU 15°C ZBOG EFIKASNIJEG DELOVANJA FUNGICIDA.

.....
POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I POŠTOVANI GLEDAOCI, DETALJNIJE INFORMACIJE O POJAVI ŠTETNIH ORGANIZAMA I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI NA SAJTU PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE WWW.PISVOJVODINA.COM