

Zelena prognoza za 9.5.2018. - O najznačajnijoj štetočini šljiva, šljivinom smotavcu

FENOFAZE ŠLJIVA

NA PODRUČJU VOJVODINE ŠLJIVE SE NALAZE U FENOFAZI OD DRUGOG OPADANJA PLODOVA DO PLODOVI OKO POLOVINE KRAJNJE VELIČINE.



SLIKA1-FAZA RAZVOJA ŠLJIVA

ŠLJIVIN SMOTAVAC (*Grapholita funebrana*)

ŠLJIVIN SMOTAVAC JE NAJZNAČAJNIJA ŠTETOČINA ŠLJIVE KOJA U NAŠIM PROIZVODNIM USLOVIMA RAZVIJA TRI GENERACIJE GODIŠNJE.

ŠTETE PRIČINJAVAJU LARVE KOJE SE HRANE MESOM PLODA. NAPADNUTI PLODOVI SE PREPOZNAJU PO SMOLOTOČINI KOJA CURI IZ NJIH, PO TAMNIM HODNICIMA U KOJIMA SE NALAZI GUSENIČNI IZMET I PO TOME ŠTO DOLAZI DO PREVREMENOG SAZREVANJA I OPADANJA PLODOVA.

VIZUELNIM PREGLEDIMA ZASADA ŠLJIVA REGISTROVANA SU JAJA SVIH RAZVOJNIH STADIJUMA KAO I TEK ISPIJENE LARVE. U TOKU JE PILJENJE LARVI PRVE GENERCIJE OVE ŠTETOČINE.



SLIKA 2. POLOŽENA JAJA ŠLJIVINOG SMOTAVCA NA PLODU



SLIKA 3. SVEŽE POLOŽENO JAJE ŠLJIVINOG SMOTAVCA NA PLODU

PREPORUKA

U CILJU SPREČAVANJA UBUŠIVANJA LARVI ŠLJIVINOG SMOTAVCA U PLODOVE, NEOPHODNO JE SPROVESTI MERE ZAŠTITE REGISTROVANIM INSEKTICIDOM:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA/KONCENTRACIJA
GROM	LAMBDA-CIHALOTRIN	0,03%