

## Zelena prognoza za 9.5.2019. - O STANJU U ZASADIMA VINOVE LOZE

### FENOFAZE VINOVE LOZE

NA PODRUČJU VOJVODINE VINOVA LOZA SE NALAZI U FAZI OD 4 RAZVIJENA LISTA DO FAZE CVAST POTPUNO RAZVIJENA.



SLIKA 1. FAZA RAZVOJA VINOVE LOZE

### PEPELJASTI GROŽĐANI MOLJAC (*Lobesia botrana*)

PEPELJASTI GROŽĐANI MOLJAC JE NAJZNAČAJNIJA ŠTETOČINA U PROIZVODNJI GROŽĐA U NAŠIM USLOVIMA. U ZAVISNOSTI OD REGIONA, RAZVIJA TRI DO ČETIRI GENERACIJE GODIŠNJE.

ŠTETNI STADIJUM SU LARVE KOJE NAKON PILJENJA UPREDAJU CVASTI VINOVE LOZE UNUTAR KOJIH SE HRANE. LARVE PRVE GENERACIJE HRANE SE CVETOVIMA, A LARVE KASNIJIH GENERACIJA OŠTEĆUJU BOBICE.

NA PODRUČJU VOJVODINE U TOKU JE PROCES PILJENJA LARVI PRVE GENERACIJE PEPELJASTOG GROŽĐANOG MOLJCA.



SLIKA 2. LARVA PEPELJASTOG GROŽĐANOG MOLJCA NA CVASTI VINOVE LOZE

### PREPORUKA

U PERIODU PILJENJA LARVI PEPELJASTOG GROŽĐANOG MOLJCA PREPORUČUJE SE PRIMENA INSEKTICIDA SA LARVICIDNIM DELOVANJEM:

PREPARAT	AKTIVNAMATERIJA	DOZA
TALSTAR 10 EC, FOBOS EC, FUTOCID EC, BIFENIKUS	BIFENTRIN	0,02 – 0,05%
CIPKORD 20 EC, CIPRAZOR 20 EC, CRNA MAMBA	CIPERMETRIN	0,015 - 0,03%

### PEPELNICA VINOVE LOZE (*Uncinula necator*)

PEPELNICA VINOVE LOZE JAVLJA SE REDOVNO U NAŠIM VINOGRADARSKIM REGIJAMA. NAPADA SVE ZELJASTE DELOVE VINOVE LOZE, LIŠĆE, LASTARE, CVETOVE I GROZDOVE. U USLOVIMA POVOLJNIM ZA NJEN RAZVOJ MOŽE BITI VEOMA ŠTETNO OBOLJENJE I VODI KA SMANJENJU PRINOSA.



SLIKA 3. PEPELNICA NA GROZDU (SIMPTOM IZ PREDHODNE VEGETACIJE)

### PREPORUKA

ZA SUZBIJANJE PEPELNICE VINOVE LOZE, PREPORUČUJE SE PRIMENA FUNGICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA/KONCENTRACIJA
KARATHANE GOLD 350 EC	MEPTILDINOKAP	0,4-0,5 L/HA

### **CRNA PEGAVOST VINOVE LOZE (*Phomopsis viticola*)**

CRNA PEGAVOST VINOVE LOZE JE BOLEST KOJA SE REDOVNO JAVLJA U NAŠIM VINOGORJIMA. SIMPTOMI PRISUSTVA OVE GLJIVE NAJJASNIJE SE UOČAVAJU U PROLEĆE. ZARAŽENI LASTARI SE PO BOJI KORE RAZLIKUJU OD ZDRAVIH, ONI SU SIVOBELE BOJE SA VELIKIM BROJEM CRNIH PIKNIDA-PLODONOSNIH TELA. LASTARI SU OŠTEĆENI U OSNOVI, DOLAZI DO NJIHOVOG PRSTENOVANJA I LOMLJENJA, CVASTI I GROZDOVI SE SUŠE. NAPADNUTA LOZA SLABIJE DOZREVA I LAKŠE IZMRZAVA U TOKU ZIME. U POČETKU RAZVOJA VINOVE LOZE I U VLAŽNIM USLOVIMA IZ PIKNIDA CURE SPORE KOJE VRŠE INFEKCIJU MLADOG ZELENOG TKIVA.

VIZUELNIM PREGLEDIMA ZASADA VINOVE LOZE REGISTRUJE SE DOMINANTNO PRISUSTVO PIKNIDA IZ KOJIH ĆE U USLOVIMA VLAŽENJA DOĆI DO OSLOBAĐANJA PIKNOSPORA.



SLIKA 4. SIMPTOMI CRNE PEGAVOSTI VINOVE LOZE NA LASTARU



SLIKA 5. PIKNIDI CRNE PEGAVOSTI VINOVE LOZE NA LASTARU

#### PREPORUKA

U ZASADIMA GDE SU REGISTROVANI SIMPTOMI OVOG PATOGENA PREPORUČUJE SE PREVENTIVNI TRETMAN PRIMENOM NEKOG OD SLEDEĆEG FUNGICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	KONCENTRACIJA
FOLPAN 50-WP	FOLPET	0,2%
MANKOGAL-80	MANKOZEB	0,2-0,25%