

# O breskvinom smotavcu

---

## FAZE BRESAKA I NEKTARINA

NA PODRUČJU VOJVODINE RANE SORTE BRESAKA I NEKTARINA SU U PROCESU BERBE DOK SE SREDNJE I KASNE SORTE NALAZE U FAZI POČETKA OBOJAVANJA PLODA.



SLIKA1-FAZA RAZVOJA NEKTARINE SORTA KALDEZI

## BRESKVIN SMOTAVAC (*Cydia molesta*)

BRESKVIN SMOTAVAC JE VEOMA ZNAČAJNA ŠTETOČINA U PROIZVODNJI VOĆA NA NAŠIM PROSTORIMA. NAJVEĆE ŠTETE PRIČINJAVA U ZASADIMA BRESAKA I NEKTARINA, A MOŽE PROUZROKOVATI ŠTETE I NA ŠLJIVAMA, KAJSIJAMA, JABUKAMA, KRUŠKAMA I DUNJAMA.

ŠTETE PRIČINJAVAJU LARVE KOJE SE UBUŠUJU U VRHOVE LASTARA ILI U PLODOVE.

LARVE BRESKVINOG SMOTAVCA SE UBUŠUJU PRI VRHU SOČNIH, JOŠ NEZDRVENJENIH LASTARA. BUŠEĆI HODNIK KROZ SREDINU, LARVA SE KREĆE NIZ LASTAR A NA ULAZNI OTVOR IZBACUJE CRVOTOČINU. JEDNA LARVA MOŽE DA OŠTETI VIŠE LASTARA KOJI NAJPRE VENU, A POTOM ŽUTE I SUŠE SE.

LARVE SE UBUŠUJU I U UNUTRAŠNJOST PLODOVA. NA MESTU ULAZA MOŽE SE VIDETI SMOLOTOČINA KOJA CURI IZ PLODA I TAKVI PLODOVI OTPADAJU PRE VREMENA.

PRISUSTVO OVE ŠTETOČINE U PLODOVIMA VOĆA MOŽE DA OGRANIČI IZVOZ, JER JE BRESKVIN SMOTAVAC KARANTINSKA ŠTETOČINA U NEKIM ZEMLJAMA GDE SE IZVOZI NAŠE VOĆE.

U NAŠIM PROIZVODNIM USLOVIMA RAZVIJA TRI DO ČETIRI GENERACIJE GODIŠNJE, U ZAVISNOSTI OD REGIONA.

U REGIONU NOVOG SADA, NA SEVERNIM OBRONCIMA FRUŠKE GORE, REGISTRUJE SE LET LEPTIRA DRUGE GENERACIJE BRESKVINOG SMOTAVCA, A TAKOĐE I POLOŽENA JAJA I TEK ISPILJENE LARVE. NA OVOM PODRUČJU U TOKU JE SAM POČETAK PILJENJA LARVI DRUGE GENERACIJE BRESKVINOG SMOTAVCA.

U REGIONIMA KIKINDE, VRBASA, RUME I SREMSKE MITROVICE POČETAK POLAGANJA JAJA OČEKUJE SE U NAREDNIH NEKOLIKO DANA.



SLIKA2-JAJE BRESKVINOG SMOTAVCA NA NALIČJU LISTA BRESKVE



SLIKA3-LARVA BRESKVINOG SMOTAVCA UBUŠENA U VRH LASTARA BRESKVE

### **PREPORUKA**

NA SEVERNOJ FRUŠKOGORSKOJ REGIJI U TOKU JE POČETAK PILJENJA LARVI DRUGE GENERACIJE BRESKVINOG SMOTAVCA. U OVOJ REGIJI, U CILJU ZAŠTITE PLODOVA OD UBUŠIVANJA LARVI PREPORUČUJE SE PRIMENA INSEKTICIDA OVICIDNO-LARVICIDNOG DELOVANJA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	KONCENTRACIJA
CORAGEN 20 SC	Hlorantraniliprol	0,016-0,02 %

PRIMENA INSEKTICIDA SE NE PREPORUČUJE U RANIM SORTAMA KOJE SU U FAZI BERBE. KARENCA NAVEDENOG INSEKTICIDA IZNOSI 14 DANA.

.....  
!