

## O STANJU U ZASADIMA ŠLJIVA

### FENOFAZE ŠLJIVA

NA PODRUČJU VOJVODINE ŠLJIVE SE NALAZE U FAZI PLODOVI DOSTIGLI POLOVINU KRAJNJE VELIČINE.



SLIKA 1. FAZA RAZVOJA ŠLJIVE

### ŠLJIVIN SMOTAVAC (*Grapholita funebrana*)

ŠLJIVIN SMOTAVAC JE NAJZNAČAJNIJA ŠTETOČINA ŠLJIVE KOJA U NAŠIM PROIZVODNIM USLOVIMA RAZVIJA TRI GENERACIJE GODIŠNJE.

ŠTETE PRIČINJAVAJU LARVE KOJE SE HRANE MESOM PLODA. NAPADNUTI PLODOVI SE PREPOZNAJU PO SMOLOTOČINI KOJA CURI IZ NJIH, PO TAMNIM HODNICIMA U KOJIMA SE NALAZI GUSENIČNI IZMET I PO TOME ŠTO DOLAZI DO PREVREMENOG SAZREVANJA I OPADANJA PLODOVA.

VIZUELNIM PREGLEDIMA ZASADA ŠLJIVA REGISTROVANA SU JAJA OVE ŠTETOČINE U RAZLIČITIM FAZAMA RAZVOJA KAO I ISPILJENE LARVE. U TOKU JE PERIOD INTENZIVNOG

PILJENJA LARVI PRVE GENERACIJE ŠLJIVINOG SMOTAVCA. U ZAVISNOSTI OD REGIONA, NALAZIMO SE NA 50 DO 70% ISPILJENIH LARVI PRVE GENERACIJE OVE ŠTETOČINE.



SLIKA 2. SVEŽE POLOŽENO JAJE ŠLJIVINOG SMOTAVCA NA PLODU



SLIKA3- JAJE ŠLJIVINOG SMOTAVCA „CRNA GLAVA“ –NEPOSREDNO PRED PILJENJE LARVI

#### PREPORUKA

U CILJU ZAŠTITE PLODOVA ŠLJIVA OD UBUŠIVANJA LARVI ŠLJIVINOG SMOTAVCA PREPORUČUJE SE PRIMENA SLEDEĆEG INSEKTICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	KONCENTRACIJA
GROM	LAMBDA-CIHALOTRIN	0,03%