

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI DOBRO DOŠLI U „ZELENU PROGNOZU“
DANAS VAS INFORMIŠEMO O STANJU U USEVIMA KUKURUZA

.....

FAZA KUKURUZA

NA PODRUČJU VOJVODINE USEVI KUKURUZA SE, U ZAVISNOSTI OD ROKA SETVE, NALAZE U FAZI OD ŠEST DO DEVET I VIŠE LISTOVA RAZVIJENO.



SLIKA 1. USEV KUKURUZA

KUKURUZNI PLAMENAC (*Ostrinia nubilalis*)

KUKURUZNI PLAMENAC JE VEOMA ZNAČAJNA ŠTETOČINA ZA NAŠE PODRUČJE I POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU. U ZAVISNOSTI OD REGIONA, U TOKU JEDNE GODINE, OVA ŠTETOČINA RAZVIJE DVE DO TRI GENERACIJE. ŠTETE PROUZROKUJU LARVE KOJE SE UBUŠUJU U BILJKE KUKURUZA U KOJIMA SE HRANE. LARVE PRVE GENERACIJE OŠTEĆUJU STABLO, DOK SE LARVE DRUGE I TREĆE GENERACIJE PORED STABLA UBUŠUJU I U KLIPOVE KUKURUZA.

VIZUELNIM PREGLEDOM BILJAKA, NA NALIČJU LISTOVA, REGISTROVANO JE PRISUSTVO PLOŽENIH JAJNIH LEGALA PRVE GENERACIJE KUKURUZNOG PLAMENCA U RAZLIČITIM


EMBRIONALNIM FAZAMA RAZVOJA. POČETAK PILJENJA LARVI SE OČEKUJE U NAREDNIM DANIMA.



SLIKA 2. JAJNO LEGLO KUKURUZNOG PLAMENCA NA NALIČJU LISTA



SLIKA 3. JAJNO LEGLO KUKURUZNOG PLAMENCA NA NALIČJU LISTA



SLIKA 4. JAJNO LEGLO KUKURUZNOG PLAMENCA NA NALIČJU LISTA

PREPORUKA

OD KUKURUZNOG PLAMENCA NAJUGROŽENIJI SU USEVI KUKURUZA ŠEĆERCA I SEMENSKOG KUKURUZA GDE JE PREPORUKA DA SE HEMIJSKE MERE ZAŠTITE SPROVEDU UKOLIKO SE NA 5% BILJAKA REGISTRUJU JAJNA LEGLA I NA POČETKU PILJENJA LARVI.

PREMA DOSADAŠNJIM OGLEDIMA SPROVEDENIM U SISTEMU PROGNOZNO-IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE, U USEVIMA MERKANTILNOG KUKURUZA, SUZBIJANJEM

PRVE GENERACIJE KUKURUZNOG PLAMENCA, PRINOSI SE POVEĆAVAJU U PROSEKU ZA OKO 5%. PRAG ŠTETNOSTI KOD MERKANTILNOG KUKURUZA, KADA JE NAOPTIMALNIJE SUZBIJANJE OVE ŠTETOČINE JE 10% BILJAKA SA POLOŽENIM JAJNIM LEGLIMA I POČETAK PILJENJA LARVI.

PROIZVOĐAČIMA KUKURUZA SE PREPORUČUJU PREGLEDI NA PRISUSTVO JAJNIH LEGALA I PO POSTIZANJU PRAGOVA ŠTETNOSTI, A NA POČETKU PILJENJA LARVI SPROVOĐENJE HEMISKE MERE ZAŠTITE. PREMA TRENUTNOJ SITUACIJI POČETAK PILJENJA LARVI SE, U ZAVISNOSTI OD REGIONA, PROGNOZIRA ZA 2 DO 4 DANA KADA SE PREPORUČUJE PRIMENA NEKOG OD INSEKTICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA
CORAGEN 20-SC	HLORANTRANILIPROL	0,1 - 0,15 L/HA
AMPLIGO 150 ZC	HLORANTRANILIPROL + LAMBDA CIHALOTRIN	0,25 L/HA
AVAUNT 15-EC	INDOKSAKARB	0,25 L/HA

.....
POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I POŠTOVANI GLEDAOCI, DETALJNIJE INFORMACIJE O POJAVI ŠTETNIH ORGANIZAMA I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI NA SAJTU PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE
WWW.PISVOJVODINA.COM