


Zelena prognoza za 9.8.2019. - O AZIJSKOJ VOĆNOJ MUŠICI (*Drosophila suzukii*)

AZIJSKA VOĆNA MUŠICA JE ŠTETOČINA JAGODIČASTOG VOĆA, KOŠTIČAVOG VOĆA I VINOVE LOZE. BILJNE VRSTE NA KOJIMA SE HRANI OVA VOĆNA MUŠICA U OPASNOSTI SU I NAJOSETLJIVIJE SU U VREME ZRENJA. ŠTETE KOJE MOŽE DA IZAZOVE SU I DO 100%. ŽENKE POLAŽU JAJA U ZDRAVE PLODOVE U FAZI ZRENJA. USLED ISHRANE LARVI PLODOVI POTPUNO PROPADAJU.



SLIKA 1. ODRASLE JEDINKE I LARVE U PLODOVIMA MALINE



SLIKA 2. LARVE AZIJSKE VOĆNE MUŠICE

NA MESTIMA GDE ŽENKA PRAVI ZAREZE PRILIKOM POLAGANJA JAJA OTVARA SE PUT ZA INFEKCIJE RAZLIČITIM VRSTAMA PATOGENA PROUZROKOVAČA TRULEŽI.



SLIKA 3. ŠTETE NA GROŽĐU



SLIKA 4. ŠTETE NA MALINAMA

NA PODRUČJU VOJVODINE U ZASADIMA MALINE, KUPINE, BRESKVE I VINOVE LOZE, NA LOVNIM KLOPKAMA, REGISTRUJE SE PRISUSTVO ODRASLIH JEDINKI AZIJSKE VOĆNE MUŠICE. IAKO SU TRENUTNE BROJNOSTI ULOVLJENIH ODRASLIH JEDINKI NA KLOPKAMA MALE, ZBOG VEOMA VISOKOG REPRODUKTIVNOG POTENCIJALA I BRZOG CIKLUSA RAZVIČA OVE ŠTETOČINE, POSTOJI RIZIK OD NASTANKA ŠTETA U ZASADIMA REMOTANTNIH SORTI MALINE, ZATIM KUPINE, U ZASADIMA SA KASNIM SORTAMA BRESAKA I U VINOGRADIMA.



SLIKA 5. IMAGO NA PLODOVIMA MALINE

U KONTROLI AZIJSKE VOĆNE MUŠICE OD KLJUČNOG ZNAČAJA SU SANITARNE MERE! U ZASADIMA REMONTANTNIH SORTI MALINE, U ZASADIMA KUPINE, BRESAKA, ŠLJIVA I U VINOGRADIMA PREPORUČUJE SE SPROVOĐENJE SLEDEĆIH MERA:

1. UNIŠTAVANJE PREZRELIH PLODOVA KOJI PREDSTAVLJAJU IDEALNU PODLOGU ZA RAZVOJ OVE ŠTETOČINE. ZBOG VLAŽNIH USLOVA KOJI SU OBELEŽILI PRVI DEO VEGETACIJE DOŠLO JE DO POJAVE TRULEŽI U ZASADIMA VOĆA. SVE PLODOVE KOJI SU OTPALI KAO I SVE PLODOVE SA SIMPTOMIMA TRULEŽI KOJI SU JOŠ UVEK NA GRANAMA POTREBNO JE UNIŠTITI. PREDLAŽE SE NJHOVO SKUPLJANJE I ODLAGANJE U BURAD KOJA SE NE OTVARAJU SEDAM DANA. NA TAJ NAČIN SPREČAVA SE RAZVOJ ŠTETOČINE I POJAVA ODRASLIH JEDINKI NOVE GENERACIJE.



SLIKA 5. PREZRELI PLODOVI BRESKVE KOJI SU OTPALI NA ZEMLJU

2. SKRAĆIVANJE INTERVALA BERBE RADI ŠTO BRŽEG SKLANJANJA ZRELIH PLODOVA SA PARCELE
3. UKLANJANJE DIVLJE KUPINE, ZOVE, DŽANARIKE I DRUGIH BILJNIH VRSTA KOJE MOGU BITI DOMAĆINI OVOJ ŠTETOČINI SA IVICA PARCELA
4. KRČENJE NAPUŠTENIH MALINJAKA SA SORTAMA POLKA I POLANA KOJI SU PRE NEKOLIKO GODINA PODIGNUTI NA PODRUČJU VOJVODINE, A SADA PREDSTAVLJAJU IDEALNO MESTO ZA NEOMETANO UMNOŽAVANJE OVE VEOMA OPASNE ŠTETOČINE.



SLIKA 6. NAPUŠTEN ZASAD MALINE

PORED SANITARNIH MERA, PREPORUČUJE SE I POSTAVLJANJE VELIKOG BROJA KLOPKI ZA MASOVNO IZLOVLJAVANJE U CILJU SMANJENJA BROJA ODRASLIH JEDINKI. KAO MIRISNI ATRAKTANT U KLOPKE SE MOŽE SIPATI MEŠAVINA CRNOG VINA I JABUKOVOG SIRĆETA SA PAR KAPI DETERDŽENTA.



SLIKA 7. KLOPKA ZA AZIJSKU VOĆNU MUŠICU