

Zelena prognoza za 10.5.2018. - O stanju u usevima pšenice

NA PODRUČJU VOJVODINE USEVI PŠENICE SE NALAZE U FAZI OD KLASANJA DO PUNOG CVETANJA.



SLIKA 1. FAZA RAZVOJA PŠENICE

VIZUELNIM PREGLEDOM USEVA OZIME PŠENICE, NA POJEDINIM PARCELAMA REGISTROVANO JE PRISUSTVO SIMPTOMA RĐE (*Puccinia spp.*). NIVO ZARAZE SE U ZAVISNOSTI OD SORTIMENTA, LOKALITETA I PREDHODNO SPROVEDENIH MERA ZAŠTITE KREĆE DO 70% ZARAŽENIH BILJAKA.



SLIKA 2. SIMPTOM RĎE I PEPLNICE NA LISTU PŠENICE



SLIKA 3. SIMPTOM RĎE NA LISTU PŠENICE



SLIKA 4. SIMPTOM RĐE NA LISTU PŠENICE

PREPORUKA

KAKO JE U TOKU ZAŠTITA PŠENICE OD FUZARIOZE KLASA, AKO MERA JOŠ NIJE SPROVEDENA, PREGLEDATI USEVE NA PRISUSTVO SIMPTOMA RĐE I AKO SE DETEKTIJU, OBAVEZNO PRIMENITI FUNGICIDE REGISTROVANE ZA SUZBIJANJE OBA PATOGENA.

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA
OSIRIS	EPOSIKONAZOL+METKONAZOL	1,5-2,5 L/HA
ARTEA 330 EC	PROPIKONAZOL+CIPROKONAZOL	0,5 L/HA
PROSARO 250 EC	TEBUKONAZOL+PROTIKONAZOL	0,75-1 L/HA
BUMPER P	PROHLORAZ+PROPIKONAZOL	0,75-1 L/HA
ANTRE PLUS	TEBUKONAZOL+TIOFANAT-METIL	1,5 L/HA

S OBZIROM DA JE PROCES NALIVANJA ZRNA TEK PRED NAMA, VEOMA JE VAŽNO SAČUVATI LISNU MASU, PRVENSTVENO LIST ZASATVIČAR I DVA LISTA ISPOD NJEGA, KAKO BI SE FIZIOLOŠKI PROCESI U BILJCI NEOMETANO ODVIJALI.