

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI DOBRO DOŠLI U „ZELENU PROGNOZU“

VEČERAS VAM SKREĆEMO PAŽNJU NA VAŽNOST PLODOREDA I NEOPHODNOST NJEGOVOG POŠTOVANJA U PREDSTOJEĆOJ PROIZVODNJI ŠEĆERNE REPE

.....

U PROIZVODNJI SVIH BILJNIH VRSTA VAŽNO JE POŠTOVATI SMENU USEVA, KAO OSNOVNOG PRAVILA DOBRE POLJOPRIVREDNE PRAKSE. POSLEDNIH GODINA, U NAŠIM BILJNIM PROIZVODNJAMA, PRISUTNO JE NEPRIDRŽAVANJE OVOG PRINCIPA, ŠTO DOVODI DO TRENUTNIH GUBITAKA PRINOSA, ALI I DUGOGODIŠNJIH POSLEDICA PO BILJNU PROIZVODNJU.

SA PORASTOM TEMPERATURA KOJI JE NAJAVLJEN ZA POČETAK SLEDEĆE NEDELJE, OČEKUJE SE I POČETAK SETVE ŠEĆERNE REPE. KAKO SE NALAZIMO PRED SAMOM SETVOM, ŽELIMO DA VAM UKAŽEMO NA ŠTETNOST PONOVLJENE SETVE ILI SETVE ŠEĆERNE REPE SA USKIM PLODOREDOM.

U NAŠIM PROIZVODNIM USLOVIMA, U PROIZVODNJI REPE SU PRISUTNI PROBLEMI KOJE PROUZROKUJU INSEKTI, FITOPATOGENE GLJIVE, VIRUSI I NEMATODE.

MERE ZAŠTITE USEVA ŠEĆERNE REPE PROTIV NEKIH ŠTETNIH ORGANIZAMA ČIJI SE INFektivNI MATERIJAL ILI POPULACIJA NAGOMILAVAJU IZ GODINE U GODINU, MOGU BITI USPEŠNE SAMO UZ POŠTOVANJE OPTIMALNE SMENE USEVA.

USPEŠNA ZAŠTITA OD ŠTETNIH ORGANIZAMA NIJE MOGUĆA SAMO PRIMENOM PESTICIDA. PRIMENA HEMIJSKIH MERA KONTROLE TREBA DA JE SAMO KRAJNJA ILI KOREKTIVNA MERA, A PRE TOGA BI TREBALO SPROVESTI SVE PREVENTIVNE MERE KOJE NAM STOJE NA RASPOLAGANJU. OD TIH PREVENTIVNIH MERA, KLJUČNA JE PRAVILNA PLODOSMENA USEVA TJ. PRAVILAN PLODORED.

UČESTALA SETVA I NEPOŠTOVANJE PLODOREDA, DOVODE DO PODIZANJA INFektivNOG MATERIJALA ŠTETNIH ORGANIZAMA U ZEMLJIŠTU, ŠTO OTEŽAVA KONTROLU NAD NJIMA. OD PROUZROKOVAČA BOLESTI KOJI PREZIMLJAVAJU U ZEMLJIŠTU I REDOVNO PRAVE PROBLEME U PROIZVODNJI TREBA NAPOMENUTI GLJIVE PROUZROKOVAČE TRULEŽI KORENA I PROUZROKOVAČA PEGAVOSTI LIŠĆA REPE, ZATIM VIRUS NEKROTIČNOG ŽUTILA NERAVA REPE KOJI PROUZROKUJE RIZOMANIJU, A OD ŠTETOČINA SIVU REPINU PIPU, REPINU NEMATODU I DRUGE.

PREPORUKA

S OBZIROM DA SETVA ŠEĆERNE REPE TEK PREDSTOJI, SADA JE VEOMA VAŽNO NAPRAVITI DOBAR ODABIR PARCELA I IZVRŠITI SETVU U NEZARAŽENA ZEMLJIŠTA. ZA SETVU ŠEĆERNE REPE PREPORUČUJE SE **PETOPOLJNI ILI ČETVOROPOLJNI PLODORED**. OVOM MEROM UTIČE SE KAKO NA SMANJENJE INFektivNOG POTENCIJALA ŠTETNIH ORGANIZAMA U OVOJ GODINI TAKO I NA OČUVANJE ZEMLJIŠNOG RESURSA ZA NAREDNI PERIOD. ZA SETVU TREBA KORISTITI MANJE OSETLJIVE SORTE ŠEĆERNE REPE.



SLIKA 1. SIMPTOMI TRULEŽ KORENA U USEVU ŠEĆERNE REPE



SLIKA 2. SIMPTOM TRULEŽI NA KORENU ŠEĆERNE REPE



SLIKA 3. SIMPTOM VENJENJA KAO POSLEDICA NAPADA REPINE NEMATODE



SLIKA 4. SIMPTOM NAPADA REPINE NEMATODE NA KORENU ŠEĆERNE REPE

.....
POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI, DETALJNIJE INFORMACIJE O
POJAVI ŠTETNIH ORGANIZAMA I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI NA SAJTU
PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE WWW.PISVOJVODINA.COM