

O STANJU U ZASADIMA KRUŠAKA

FAZE RAZVOJA KRUŠAKA

NA PODRUČJU VOJVODINE KRUŠKE SE NALAZE U FAZI PRECVETAVANJA I TEK ZAMETNUTIH PLODIĆA.



SLIKA 1. FAZA RAZVOJA KRUŠKE, SORTA VILJAMOVKA

OBIČNA KRUŠKINA BUVA (*Cacopsylla pyri*)

OBIČNA KRUŠKINA BUVA JE NAJZNAČAJNIJA ŠTETOČINA KRUŠAKA U NAŠIM PROIZVODNIM USLOVIMA. GLAVNI JE PROBLEM U INTENZIVNOJ PROIZVODNJI, A ŠTETE PRIČINJAVAJU LARVE KOJE SISAJU SOKOVE BILJAKA I LUČE VELIKE KOLIČINE MEDNE ROSE. PRISUTNA MEDNA ROSA NA LASTARIMA, LISTOVIMA I PLODOVIMA SMANJUJE ASIMILACIONU POVRŠINU I OMOGUĆAVA NASELJAVANJE GLJIVE ČAĐAVICE, A SVE UTIČE NA SMANJENJE PRINOSA I SMANJENJE TRŽIŠNE VREDNOSTI PLODOVA.

STANJE U ZASADIMA KRUŠAKA

U ZASADIMA KRUŠAKA REGISTRUJE SE PRISUSTVO JAJA I LARVI SVIH RAZVOJNIH STUPNJEVA OBIČNE KRUŠKINE BUVE.

PRE DVE NEDELJE SMO VAS INFORMISALI O PRISUSTVU LARVI OVE ŠTETOČINE I POTREBI SPROVOĐENJA HEMIJSKIH MERA ZAŠTITE.

OD TADA, REGISTRUJU SE NOVA PILJENJA A TRENUTNI INDEKSI LARVI UPUĆUJU NA POTREBU SPROVOĐENJA JOŠ JEDNOG TRETMANA.



SLIKA 2. ISPIJENE LARVE NA NALIČJU LISTA KRUŠKE



SLIKA 3. LARVE MLAĐEG RAZVOJNOG STUPNJA OBIČNE KRUŠKINE BUVE



SLIKA 4. LARVA STARIJEG RAZVOJNOG STUPNJA OBIČNE KRUŠKINE BUVE

PREPORUKA

ZA SUZBIJANJE LARVI OBIČNE KRUŠKINE BUVE U OVOM PERIODU PREPORUČUJE SE PRIMENA NEKOG OD SLEDEĆIH INSEKTICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA/KONCENTRACIJA
VERTIMEC 018-EC, ABASTATE, KRAFT 1,8 EW, GAT VERTIS 1,8 CS	ABAMEKTIN	0,15%

UZ INSEKTICID PREPORUČUJE SE I PRIMENA PREPARATA NA BAZI MINERALNOG ULJA U KONCENTRACIJI OD 0,3%.