

## O STANJU U ZASADIMA JABUKA

---

### FENOFAZE JABUKA

NA PODRUČJU VOJVODINE JABUKE SE NALAZE U FAZI RAZVOJA PLODOVA, PLODOVI SU DOSTIGLI DIMENZIJE DO 20 MILIMETARA.



SLIKA 1. FAZA RAZVOJA JABUKE SORTE ZLATNI DELIŠES

### STANJE U ZASADIMA JABUKA

#### 1. JABUKIN SMOTAVAC (*Carpocapsa pomonella*)

JABUKIN SMOTAVAC JE NAZNAČAJNIJA ŠTETOČINA JABUKE U NAŠIM PROIZVODNIM USLOVIMA. NA PODRUČJU VOJVODINE REGISTRUJE SE PRISUSTVO JAJA OVE ŠTETOČINE NA LISTOVIMA. U REGIONIMA NOVOG SADA I PANČEVA ZAPOČEO JE PROCES PILJENJA LARVI, DOK SE NA OSTALIM REGIONIMA U VOJVODINI POČETAK PILJENJA OČEKUJE U NAREDNIH NEDELJU DANA.



SLIKA 2. JAJE JABUKINOG SMOTVACA NA LISTU JABUKE

#### PREPORUKA

NA POČETKU PILJENJA LARVI U ZASADIMA JABUKA PREPORUČUJE SE PRIMENA INSEKTICIDA OVICIDNO-LARVICIDNOG DELOVANJA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	KONCENTRACIJA
RUNNER 240-SC	METOKSIFENOZID	0,04-0,06%

**2. ČAĐAVA PEGAVOST LISTOVA I KRSTAVOST PLODOVA JABUKE (*Venturia inaequalis*)**

**3. PEPELNICA JABUKE (*Podosphaera leucotricha*)**

U USLOVIMA KOJI TRENUTNO VLADAJU, U ZASADIMA JABUKA NEOPHODNO JE NASTAVITI ZAŠTITU OD PROUZROKOVAČA ČAĐAVE PEGAVOSTI LISTOVA I KRSTAVOSTI PLODOVA KAO I OD PROUZROKOVAČA PEPELNICE. U TU SVRHU PREPORUČUJE SE PRIMENE SLEDEĆE KOMBINACIJE PREPARATA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	KONCENTRACIJA
LUNA EXPIRIENCE	TEBUKONAZOL+FLUOPIRAM	0,075%
+	+	+
CAPTAN 50 WP	KAPTAN	0,3%