

Zelena prognoza za 11.5.2018. - O stanju u usevima kupusa

FAZE KUPUSA

NA PODRUČJU VOJVODINE USEVI RANOG KUPUSA NALAZE SE U FAZI OD PET DO DEVET RAZVIJENIH LISTOVA.



SLIKA 1. USEV KUPUSA

KUPUSNI MOLJAC (*Plutella maculipennis*)

KUPUSNI MOLJAC JE VEOMA ZNAČAJNA ŠTETOČINA KUPUSNJAČA NA NAŠEM TERENU. ŠTETE PRIČINJAVAJU GUSENICE KOJE SE HRANE LISTOVIMA KUPUSNJAČA, A U KASNIJIM FAZAMA RAZVOJA UBUŠUJU SE U GLAVICU. PRI JAČEM NAPADU DOLAZI DO GOLOBRSTA KADA OSTAJU SAMO GLAVNI NERVI NA LISTOVIMA KUPUSNJAČA. TOKOM JEDNE GODINE U NAŠIM USLOVIMA RAZVIJA SEDAM DO OSAM GENERACIJA.

TEMPERATURE U APRILU MESECU KOJE SU BILE IZNAD VIŠEGODIŠNJIH PROSEKA, DOVELE SU DO UBRZANOG RAZVOJA OVE ŠTETOČINE. U ODNOSU NA PROŠLU GODINU KADA SMO U PRVOJ DEKADI MAJA REGISTROVALI RAZVOJ PRVE GENERACIJE, U OVOJ GODINI U TOKU JE RAZVOJ DRUGE GENERACIJE.

NA FEROMONSKIM KLOPKAMA POVEĆANI SU ULOVI IMAGA KUPUSOVOG MOLJCA. U VIZUELNIM PREGLEDIMA BILJAKA KUPUSA REGISTRUJU SE VELIKE BROJNOSTI JAJA I LARVI. U NAREDNIH NEKOLIKO DANA OČEKUJE SE INTENZIVNO PILJENJE LARVI DRUGE GENERACIJE KUPUSOVOG MOLJCA.



SLIKA 2. JAJA KUPUSOVOG MOLJCA



SLIKA 3. JAJA I LARVA KUPUSOVOG MOLJCA



SLIKA 4. TRIPSI I VAŠI NA LISTU KUPUSA



SLIKA 5. KUPUSNA BELA MUŠICA

PREPORUKA

U USEVIMA KUPUSNJAČA PORED PRISUSTVA KUPUSOVOG MOLJCA, REGISTRUJE SE JOŠ I PRISUSTVO TRIPSA, KUPUSNE BELE MUŠICE, LISNIH VAŠI I BUVAČA.

ZA SUZBIJANJE NAVEDENIH ŠTETOČINA PREPORUČUJE SE PRIMENA SLEDEĆE KOMBINACIJE INSEKTICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA
LAMDEX ILI KOZAK ILI LAMBADA	LAMBDA-CIHALOTRIN	0,3 L/HA
+	+	+
KOHINOR 200 SL	IMIDAKLOPRID	0,5 L/HA