

O PRISUSTVU ŠTETNIH SOVICA U USEVIMA PAPRIKE

FAZE PAPRIKE

NA PODRUČJU VOJVODINE USEVI PAPRIKE NALAZE SE U RAZLIČITIM FAZAMA RAZVOJA U ZAVISNOSTI OD NAČINA PROIZVODNJE. USEVI PAPRIKE IZ SEMENA NALAZE SE U FAZI CVETANJA, A USEVI PAPRIKE IZ RASADA U RAZLIČITIM FAZAMA RAZVOJA PLODOVA.



SLIKA 1. USEV PAPRIKE, PROIZVODNJA IZ RASADA



SLIKA 2. FAZA RAZVOJA PLODOVA U USEVU PAPRIKE-PROIZVODNJA IZ RASADA

PAMUKOVA SOVICA (*Helicoverpa armigera*), SOVICA GAMA (*Autographa gamma*) I DRUGE ŠTETNE SOVICE

NA USEVIMA PAPRIKE REGISTRUJE SE PRISUSTVO JAJA NEKOLIKO VRSTA SOVICA. NA LICU LISTA MOGU SE UOČITI JAJA PAMUKOVE SOVICE, A NA NALIČJU LISTA JAJA SOVICE GAMA, KUPUSNE SOVICE I DRUGIH LISNIH SOVICA.

OD OVIH ŠTETOČINA, U PROIZVODNJI PAPRIKE, NAJZNAČAJNIJA JE PAMUKOVA SOVICA. ŠTETE PRIČINJAVAJU LARVE KOJE SE UBUŠUJU U PLODOVE PAPRIKE I HRANE SE MESOM PLODA. TAKVI PLODOVI, ZAPRLJANI IZMETOM, GUBE TRŽIŠNU VREDNOST I PODLOŽNI SU NAPADU RAZNIH VRSTA TRULEŽI.

PAMUKOVA SOVICA JE ŠTETOČINA TOPLIH REGIJA PLANETE. KAO MIGRATORNA VRSTA I DOBAR LETAČ, NA NAŠE PODRUČJE DOLAZI U LETNJEM PERIODU. SA TRENDOM PORASTA TEMPERATURA POVEĆAVA SE NJENA BROJNOST I ŠTETNOST. USLOVI KOJI TRENUTNO VLADAJU U PROIZVODNJI SU IZUZETNO POVOLJNI ZA RAZVOJ OVE ŠTETOČINE. U NAREDNOM PERIODU OČEKUJE SE INTENZIVNO POLAGANJE JAJA PAMUKOVE SOVICE KAKO NA USEVE PAPRIKE, TAKO I NA KUKURUZU, PARADAJZU, BORANIJI I MNOGIM DRUGIM BILJNIM VRSTAMA.

PAMUKOVA SOVICA POLAŽE PO JEDNO, REĐE 2 DO 3 JAJETA NA LICE LISTA I NA GENERATIVNE ORGANE – NA PUPOLJKE, CVETOVE I PLODOVE, ODNOSNO NA SVE JEDRE I MLADE DELOVE BILJAKA.

SVEŽE POLOŽENA JAJA SU BELE BOJE A KASNIJE DOBIJAJU SMEĐU NIJANSU. SFERIČNOG SU OBLIKA SA UZDUŽNIM REBRIMA I MNOGIM POPREČNIM GREBENIMA IZMEĐU REBARA. EMBRIONALNI RAZVOJ ZAVISI PRE SVEGA OD TEMPERATURE, A U USLOVIMA KOJI SE TRENUTNO REGISTRUJU NA NAŠEM PODRUČJU, MOŽE DA TRAJE SVEGA NEKOLIKO DANA.



SLIKA 3. SVEŽE POLOŽENO JAJE PAMUKOVE SOVICE



SLIKA 4. JAJE PAMUKOVE SOVICE NA LICU LISTA PAPRIKE

PREPORUKA

U USEVIMA PAPRIKE KOJI SU U FAZI FORMIRANJA PLODOVA NEOPHODNO JE DETALJNO PREGLEDATI BILJKE NA PRISUSTVO JAJA SOVICA, PRVENSTVENO PAMUKOVE SOVICE. UKOLIKO SE REGISTRUJE NJIHOVO PRISUSTVO POTREBNO JE PREDUZETI MERE ZAŠTITE NA POČETKU PILJENJA LARVI NEKIM OD SLEDEĆIH INSEKTICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA/KONCENTRACIJA
AVAUNT 15 EC	INDOKSAKARB	0,25 L/HA
AFFIRM 095 SG	EMAMEKTIN BENZOAT	1,5-2,0 KG/HA