

Zelena prognoza za 11.7.2019. - O STANJU U ZASADIMA JABUKA I POTREBI SPROVOĐENJA MERA ZAŠTITE

FAZE JABUKE

NA PODRUČJU VOJVODINE ZASADI JABUKA SE NALAZE U ZAVISNOSTI OD SORTIMENTA U RAZLIČITIM FAZAMA RAZVOJA PLODOVA, PLODOVI DOSTIGLI OD 50 DO 80% KRAJNJE VELIČINE.



SLIKA 1. FAZA RAZVOJA JABUKE

JABUKIN SMOTAVAC (*Carpocapsa pomonella*)

JABUKIN SMOTAVAC JE NAJZNAČAJNIJA ŠTETOČINA JABUKE. U NAŠIM PROIZVODNIM USLOVIMA RAZVIJA TRI DO ČETIRI GENERACIJE GODIŠNJE.

ŠTETE PRIČINJAVAJU LARVE KOJE SE UBUŠUJU U PLODOVE I ISHRANJUJU MESOM PLODA I SEMENKAMA. NAPADNUTI PLODOVI PREVREMENO OTPADAJU I GUBE TRŽIŠNU VREDNOST.



SLIKA 2. LARVA JABUKINOG SMOTAVCA U PLODU JABUKE

U ZASADIMA JABUKA NA PODRUČJU VOJVODINE U TOKU JE PILJENJE LARVI DRUGE GENERACIJE JABUKINOG SMOTAVCA. U VIZUELNIM PREGLEDIMA PLODOVA JABUKA REGISTRUJE SE PRISUSTVO SVIH RAZVOJNIH STADIJUMA JAJA I TEK ISPIJENE LARVE OVE ŠTETOČINE.



SLIKA 3. JAJE JABUKINOG SMOTAVCA NA PLODU JABUKE (JAJE U FAZI „CRVENI OREOL“)



SLIKA 4. JAJE JABUKINOG SMOTAVCA NA PLODU (JAJE U FAZI „CRNA GLAVA“, NEPOSREDNO PRED PILJENJE)

PREPORUKA

U CILJU ZAŠTITE PLODOVA JABUKE OD UBUŠIVANJA LARVI JABUKINOG SMOTAVCA PREPORUČUJE SE PRIMENA INSEKTICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	KONCENTRACIJA
GROM, ŠAKAL	LAMBDA-CIHALOTRIN	0,02%

PEPELNICA JABUKE (*Podosphaera leucotricha*)

U ZASADIMA JABUKA SA OSETLJIVIM SORTIMENTOM REGISTRUJE SE PRISUSTVO SIMPTOMA PEPELNICE JABUKE. USLOVI U KOJIMA SE ODVIJA PROIZVODNJA SU POVOLJNI ZA RAZVOJ OVOG PATOGENA.



SLIKA 5. SIMPTOM PEPELNICE JABUKE

PREPORUKA

ZA SUZBIJANJE PEPELNICE JABUKE PREPORUČUJE SE PRIMENA FUNGICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA/KONCENTRACIJA
TOPAS 100-EC	PENKONAZOL	0,04%