

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI DOBRO DOŠLI U „ZELENU PROGNOZU“

DANAS VAS INFORMIŠEMO O BRAON MRAMORASTOJ STENICI U USEVIMA I ZASADIMA

.....

BRAON MRAMORASTA STENICA VODI POREKLO IZ ISTOČNE AZIJE. U EVROPI NJENO PRISUSTVO ZVANIČNO JE POTVRĐENO 2007. GODINE U ŠVAJCARSKOJ. PROMENE USLOVA U NAŠEM PODNEBLJU USLOVILE SU NJENU POJAVU I U NAŠOJ ZEMLJI, 2015. GODINE.

OD TADA, DOŠLO JE DO ZNAČAJNOG POVEĆANJA NJENE BROJNOSTI ŠTO PREDSTAVLJA VISOK POTENCIJAL DA POSTANE EKONOMSKI ZNAČAJNA ŠETNA VRSTA VELIKOG BROJA GAJENIH KULTURA.

OVU STENICU KAKRAKTERIŠE IZUZETNA POLOIFAGNOST, PA JE DO DANAS NJENO PRISUSTVO REGISTROVANO NA PREKO 300 BILJNIH VRSTA, MEĐU KOJIMA JE I VELIKI BROJ POLJOPRIVREDNIH KULTURA. DO SADA, KOD NAS, UOČENA JE U USEVIMA SOJE, KUKURUZA, PARADAJZA, PAPRIKE, KROMPIRA KAO I U ZASADIMA JABUKA, KRUŠAKA, BRESAKA, TREŠANJA, VIŠANJA, ORAHA, LESKE, MALINE I VINOVE LOZE.

ŠTETE NA USEVIMA OD BRAON MRAMORASTE STENICE NASTAJU USLED ISHRANE LARVI I ODRASLIH JEDINKI. ONE POSEDUJU USNI APARAT ZA BODENJE I SISANJE SA KOJIM SIŠU SOKOVE IZ SVIH NADZEMNIH DELOVA BILJAKA, A NAJVIŠE PREFERIRAJU DA SE HRANE NA PLODOVIMA. NA POVRŠINI PLODOVA USLED ISHRANE NASTAJU NEKROTIČNE TAČKE I UDUBLJENJA I TAKVI PLODOVI GUBE TRŽIŠNU VREDNOST.

U OVOM MOMENTU, NAJVEĆI RIZIK OD NASTANKA ŠTETA POSTOJI U ZASADIMA KASNOSTASNIH SORTI BRESAKA, NEKTARINA I ŠLJIVA, ZASADIMA VINOVE LOZE I LESKE, REMOTANTNIH SORTI MALINE, KAO I USEVIMA SOJE, POSTRNE BORANIJE, PAPRIKE I PARADAJZA.

U USEVIMA I ZASADIMA NIVO PRISUSTVA BRAON MRAMORASTE STENICE SE RAZLIKUJE U ZAVISNOSTI OD DO SADA PRIMENJNIH HEMIJSKIH MERA ZAŠTITE USMERENIH NA SUZBIJANJE RAZLIČITIH ŠTETOČINA.

PREPORUKA

PROIZVOĐAČIMA SE PREPORUČUJE OBAVEZAN PREGLED USEVA I ZASADA NA PRISUSTVO BRAON MRAMORASTE STENICE. GDE SE POTVRDI PRISUSTVO POMENUTE ŠTETOČINE I GDE JE MOGUĆE, PREPORUČUJE SE PRIMENA NEKOG OD REGISTROVANIH INSEKTICIDA IZ GRUPE PIRETROIDA KOJI SU POKAZALI DOBRU EFIKASNOST U NJENOM SUZBIJANJU, POPUT INSEKTICIDA NA BAZI AKTIVNIH MATERIJA DELTAMETRIN I LAMBDA-CIHALOTRIN.

S OBZIROM DA JE KOD VELIKOG BROJA POLJOPRIVREDNIH USEVA I ZASADA BERBA U TOKU ILI SE OČEKUJE, STROGO TREBA VODITI RAČUNA O KARENCI PRIMENJENIH PREPARATA!



SLIKA 1. BRAON MRAMORASTA STENICA NA RAZLIČITIM RATARSKO-POVRTARSKIM USEVIMA



SLIKA 2. BRAON MRAMORASTA STENICA NA RAZLIČITIM VOĆNIM VRSTAMA



SLIKA 3. ODRASLA JEDINKA BRAON MRAMORASTE STENICE NA PLODU LESKE



SLIKA 4. ISPILJENO JAJNO LEGLO I LARVE BRAON MRAMORASTE STENICE NA LISTU LESKE



SLIKA 5. ODRASLA JEDINKA BRAON MRAMORASTE STENICE NA PLODU PAPRIKE



SLIKA 6. ISPIJENO JAJNO LEGLO I LARVE BRAON MRAMORASTE STENICE NA VINOVOJ LOZI



SLIKA 7. ODRASLA JEDINKA BRAON MRAMORASTE STENICE NA SOJI

.....

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I POŠTOVANI GLEDAOCI, DETALJNIJE INFORMACIJE
O POJAVI ŠTETNIH ORGANIZAMA I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI NA SAJTU
PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE WWW.PISVOJVODINA.COM