

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI DOBRO DOŠLI U „ZELENU PROGNOZU“  
DANAS VAS INFORMIŠEMO O MERAMA ZAŠTITE U ZASADIMA BRESAKA I NEKTARINA

---

### **FENOFAZE RAZVOJA BRESAKA I NEKTARINA**

NA PODRUČJU VOJVODINE, BRESKVE I NEKTARINE SE NALAZE U RAZLIČITIM FAZAMA RAZVOJA U ZAVISNOSTI OD REGIONA, EKSPozICIJE TERENA I SORTIMENTA. SORTE RANIH GRUPA ZRENJA SE NALAZE U FAZAMA NEPOSREDNO PRED CVETANJE, DOK SE SORTE SREDNJIH I KASNIH GRUPA ZRENJA NALAZE U FAZAMA OD KRAJA BUBRENJA PUPOLJAKA DO POJAVE ZELENIH LISTIĆA.



SLIKA 1. FAZA BRESKVE NEPOSREDNO PRED CVETANJE



SLIKA 2. FAZA POJAVE „ZELENE TAČKE“

SA NAJAVLJENIM PADAVINAMA, U ZASADIMA BRESAKA I NEKTARINA, U ZAVISNOSTI OF FAZE RAZVOJA, POSTOJI VISOK RIZIK OD INFEKCIJA GLJIVAMA KOJE PROUZROKUJU SUŠENJE CVETOVA, GRANA I GRANČICA KOŠTIČAVOG VOĆA (*Monilinia laxa*) I KOVRĐAVOST LISTA BRESKVE (*Taphrina deformans*).

#### **PROUZROKOVAČIMA SUŠENJA CVETOVA, GRANA I GRANČICA KOŠTIČAVOG VOĆA (*Monilinia laxa*)**

U PERIODU CVETANJA KOŠTIČAVOG VOĆA MOŽE DOĆI DO INFEKCIJE CVETA GLJIVOM KOJA PROUZROKUJE SUŠENJE CVETOVA, GRANA I GRANČICA (*Monilia laxa*). INFEKCIJA CVETA SE OSTVARUJE PREKO ŽIGA TUČKA, A POVOLJNI USLOVI ZA OSTVARENJE INFEKCIJE SU PRISUSTVO PADAVINA ILI VISOKA RELATIVNA VLAŽNOST VAZDUHA (85%) I TEMPERATURA OD 0 DO 25°C. UKOLIKO JE VEĆ OSTVARENA INFEKCIJA NEMOGUĆE JE SPREČITI RAZVOJ SIMPTOMA PRIMENOM FUNGICIDA, TE JE NEOPHODNO SPOROVESTI PREVENTIVNE MERE ZAŠTITE.



SLIKA 3. SIMPTOM *Monilinia laxa*

#### **KOVRĐAVOST LISTA BRESKVE (*Taphrina deformans*)**

GLJIVA KOJA PROUZROKUJE KOVRĐAVOST LISTA BRESKVE PREZIMLJAVA NA KORI I PUPOLJICIMA. PRILIKOM PROHLADNOG I VLAŽNOG VREMENA, U OSETLJIVIM FAZAMA BUBRENJA I OTVARANJA PUPOLJAKA BRESAKA I NEKTARINA, MOŽE DOĆI DO INFEKCIJA OVIM PATOGENOM. OVAJ PATOGEN OSTVARUJE SAMO PRIMARNE INFEKCIJE MLADOG NEIZDIFERENCIRANOG TKIVA. RAZVOJEM BILJAKA TKIVO POSTAJE OTPORNO ŠTO ONEMOGUĆAVA SEKUNDARNE INFEKCIJE. U BORBI PROTIV OVOG OBOLJENJA KLJUČNA JE PREVENTIVNA PRIMENA FUNGICIDA.



SLIKA 4. SIMPTOM KOVRDŽAVOSTI LISTA BRESKVE NA LISTU



SLIKA 5. SIMPTOM KOVRDŽAVOSTI LISTA BRESKVE NA LISTU



SLIKA 6. SIMPTOM KOVRDŽAVOSTI LISTA BRESKVE NA PLODU

#### PREPORUKA

U ZAVISNOSTI OD FAZE RAZVOJA BRESAKA I NEKTARINA, PRED NAJAVLJENE PADAVINE, PREPORUČUJE SE SPROVOĐENJE HEMIJSKIH MERA ZAŠTITE:

KOD SORTI KOJE SE NALAZE U FAZAMA CVETANJA PREPORUČUJE SE PRIMENA NEKOG OD FUNGICIDA U CILJU SUZBIJANJA PROUZROKOVAČA SUŠENJA CVETOVA, GRANA I GRANČICA KOŠTIČAVOG VOĆA (*Monilia laxa*):

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	KONCENTRACIJA/DOZA
CIPRODEX	CIPRODINIL	0,05%
SIGNUM	BOSKALID+PIRAKLOSTROBIN	0,562 – 0,75 KG/HA
OCTAVE	PROHLORAZ	0,04%

KOD SORTI KOJE SE NALAZE U FAZI BUBRENJA LISNIH PUPOLJAKA I POJAVE „ZELENE TAČKE, U CILJU ZAŠTITE OD PROUZROKOVAČA KOVRDŽAVOSTI LISTA BRESKVE PREPORUČUJE SE PRIMENA NEKOG OD FUNGICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	KONCENTRACIJA
SYLLIT 400 SC	DODIN	0,15-0,25%
FITOCIRAM 75 S, CIRAM S 75	CIRAM	0,25-0,35%
DELAN 700 WG, GALILEO, FIESTA	DITIANON	0,075%

.....  
POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI, DETALJNIJE INFORMACIJE O  
POJAVI ŠTETNIH ORGANIZAMA I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI NA SAJTU  
PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE [WWW.PISVOJVODINA.COM](http://WWW.PISVOJVODINA.COM)