

## O NAJZNAČAJNIJOJ ŠTETOČINI ŠLJIVA, ŠLJIVINOM SMOTAVCU

### FENOFAZE ŠLJIVA

NA PODRUČJU VOJVODINE ŠLJIVE SE NALAZE U FENOFAZI DRUGO OPADANJE PLODOVA.



SLIKA1-FAZA RAZVOJA ŠLJIVA

### ŠLJIVIN SMOTAVAC (*Grapholita funebrana*)

ŠLJIVIN SMOTAVAC JE NAJZNAČAJNIJA ŠTETOČINA ŠLJIVE KOJA U NAŠIM PROIZVODNIM USLOVIMA RAZVIJA TRI GENERACIJE GODIŠNJE.

ŠTETE PRIČINJAVAJU LARVE KOJE SE HRANE MESOM PLODA. NAPADNUTI PLODOVI SE PREPOZNAJU PO SMOLOTOČINI KOJA CURI IZ NJIH, PO TAMNIM HODNICIMA U KOJIMA SE NALAZI GUSENIČNI IZMET I PO TOME ŠTO DOLAZI DO PREVREMENOG SAZREVANJA I OPADANJA PLODOVA.

VIZUELNIM PREGLEDIMA ZASADA ŠLJIVA REGISTROVANA SU JAJA OVE ŠTETOČINE NA PLODOVIMA. U REGIONIMA PANČEVA, RUME, VRBASA I ZRENJANINA NALAZIMO SE PRED SAMIM PROCESOM PILJENJA LARVI, DOK SE U OSTALIM REGIONIMA VOJVODINE POČETAK PILJENJA OČEKUJE ZA 7 DO 10 DANA.



SLIKA 2. SVEŽE POLOŽENO JAJE ŠLJIVINOG SMOTAVCA



SLIKA 3. SVEŽE POLOŽENO JAJE ŠLJIVINOG SMOTAVCA

## **PREPORUKA**

PROIZVOĐAČIMA ŠLJIVA SE PREPORUČUJE OBILAZAK ZASADA I PREGLED PLODOVA NA PRISUSTVO JAJA ŠLJIVINOG SMOTAVCA. ZA SADA SE HEMIJSKE MERE ZAŠTITE NE PREPORUČUJU, A SISTEM PROGNOZE ĆE U NAREDNOM PERIODU DATI SIGNAL ZA PRIMENU INSEKTICIDA.