

O ŠTETOČINAMA U ZASADIMA JABUKA I POTREBI SPROVOĐENJA MERA ZAŠTITE

FAZE JABUKE

NA PODRUČJU VOJVODINE ZASADI JABUKA SE NALAZE U ZAVISNOSTI OD SORTIMENTA U RAZLIČITIM FAZAMA RAZVOJA PLODOVA. LETNJE SORTE SU U FAZI SAZREVANJA , A OSTALE SORTE SU U FAZI PLODOVI DOSTIGLI 70% KRAJNJE VELIČINE.



SLIKA 1. FAZA RAZVOJA JABUKE

JABUKIN SMOTAVAC (*Carpocapsa pomonella*)

U ZASADIMA JABUKA NA PODRUČJU VOJVODINE U TOKU JE PILJENJE LARVI DRUGE GENERACIJE JABUKINOG SMOTAVCA. U VIZUELNIM PREGLEDIMA PLODOVA JABUKA REGISTRUJE SE PRISUSTVO SVIH RAZVOJNIH STADIJUMA JAJA I TEK ISPILJENIH LARVI OVE ŠTETOČINE.



SLIKA 2. JAJA JABUKINOG SMOTAVCA NA PLODOVIMA JABUKE (SVEŽE POLOŽENO JAJE I JAJE PRED PILJENJE)



SLIKA 3. LARVA JABUKINOG SMOTAVCA NA PLODU

PREPORUKA

OD POSLEDNJE PREPORUKE ODNOSNO OD VREMENA PRETHODNOG TRETMANA PROŠLO JE DOVOLJNO VREMENA DA NE MOŽEMO RAČUNATI NA DALJU EFIKASNOST INSEKTICIDA.

U CILJU ZAŠTITE PLODOVA JABUKE OD UBUŠIVANJA LARVI JABUKINOG SMOTAVCA PREPORUČUJE SE PRIMENA SLEDEĆEG INSEKTICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	KONCENTRACIJA
AFINEX, KESTREL, TONUS, MOSPILAN 20-SG	ACETAMIPRID	0,025%

KARENCA ZA NAVEDENE PREPARATE IZNOSI 28 DANA. U ZASADIMA GDE JE U TOKU BERBA NE PREPORUČUJE SE PRIMENA INSEKTICIDA.

KRVAVA VAŠ (*Eriosoma lanigerum*)

KRVAVA VAŠ SPADA U GRUPU ŠTETOČINA KOJA ZAUSTAVLJA RAST I IZAZIVA PROPADANJE GRANA I STABALA. NJENO PRISUSTVO U ZASADU JABUKE LAKO JE UOČLJIVO, JER OVA VAŠ FORMIRA BELU VATASTU PREVLAKU NA LISNIM DRŠKAMA, DEBLU I GRANAMA.



SLIKA 4. KOLONIJA KRVAVE VAŠI NA GRANI JABUKE

NA MESTIMA ISHRANE OVIH VAŠI STVARAJU SE IZRASLINE, KORA PUCA, TE DOLAZI DO SUŠENJA NAPADNUTIH DELOVA, A ČESTO I GRANA. UKOLIKO SE KOLONIJE KRVAVE VAŠI GODINAMA JAVLJAJU NA STABLIMA, MOŽE DOĆI DO NJIHOVOG POTPUNOG SUŠENJA.

PREPORUKA

U ZASADIMA JABUKA GDE SU PRISUTNE KOLONIJE KRVAVE VAŠI PREPORUČUJE SE PRIMENA INSEKTICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	KONCENTRACIJA
MOVENTO 100 SC	SPIROTETRAMAT	0,15%

KARENCA ZA NAVEDENI INSEKTICID IZNOSI 21 DAN.