

## O STANJU U ZASADIMA BRESAKA I VINOVE LOZE

### FAZE BRESAKA I NEKTARINA

NA PODRUČJU VOJVODINE, SREDNJE I KASNE SORTE BRESAKA I NEKTARINA SE NALAZE U FAZI PRECVETAVANJA.



SLIKA 1. FAZA PRECVETAVANJA NEKTARINE, SORTA INDIPENDENS

### TRIPSI U BRESKVAMA I NEKTARINAMA

TRIPSI SU U POSLEDNJIH NEKOLIKO GODINA VEOMA ZNAČAJNE ŠTETOČINE VOĆA NA NAŠEM PROSTORU, A NAJVEĆE ŠTETE PRIČINJAVAJU NA NEKTARINAMA I BRESKVAMA. ISHRANOM NA CVETOVIMA OŠTEĆUJU LATICE, PRAŠNIKE I TUČAK. ŽENKA PRAVI ŠTETE I TOKOM POLAGANJA JAJA NA CVETOVIMA. IZ JAJA SE PILE LARVE KOJE TAKOĐE ISHRANOM NANOSE ŠTETE NA TUČKU I TEK ZAMETNUTIM PLODOVIMA. NAPADNUTI PLODOVI NEKROTIRAJU I DEFORMIŠU SE. SA RAZVOJEM PLODOVA DOLAZI DO NJIHOVOG PUCANJA, A ČESTO IZ NJIH CURI I SMOLA.

TRENUTNO SE U ZASADIMA BRESAKA I NEKTARINA REGISTRUJU IZUZETNO VISOKE BROJNOSTI LARVI TRIPSA NA TEK ZAMETNUTIM PLODIĆIMA. OVAKO VISOKE BROJNOSTI UPUĆUJU NA NEOPHODNOST SPROVOĐENJA MERA ZAŠTITE.



SLIKA 2. LARVE TRIPSA NA PLODIĆU NEKTARINE

#### **PREPORUKA**

U ZASADIMA KOJI SU U PRECVETAVANJU, ZA SUZBIJANJE TRIPSA, PREPORUČUJE SE PRIMENA SLEDEĆEG INSEKTICIDA:

<b>PREPARAT</b>	<b>AKTIVNA MATERIJA</b>	<b>DOZA</b>
LASER 240-SC	SPINOSAD	0,4 L/HA

#### **FAZE VINOVE LOZE**

NA PODRUČJU VOJVODINE, U ZAVISNOSTI OD SORTIMENTA I LOKALITETA, VINOVA LOZA SE NALAZI U RAZLIČITIM FAZAMA RAZVOJA LISTOVA.



SLIKA 3. FAZA RAZVOJA VINOVE LOZE

### **CRNA PEGAVOST VINOVE LOZE (*Phomopsis viticola*)**

CRNA PEGAVOST VINOVE LOZE JE BOLEST KOJA SE REDOVNO JAVLJA U NAŠIM VINOGORJIMA. SIMPTOMI PRISUSTVA OVE GLJIVE NAJJASNIJE SE UOČAVAJU U PROLEĆE. ZARAŽENI LASTARI SE PO BOJI KORE RAZLIKUJU OD ZDRAVIH, ONI SU SIVOBELI BOJE SA VELIKIM BROJEM CRNIH PIKNIDA-PLODONOSNIH TELA. LASTARI SU OŠTEĆENI U OSNOVI, DOLAZI DO NJIHOVOG PRSTENOVANJA I LOMLJENJA, CVASTI I GROZDOVI SE SUŠE. NAPADNUTA LOZA SLABIJE DOZREVA I LAKŠE IZMRZAVA U TOKU ZIME.

U POČETKU RAZVOJA VINOVE LOZE I U VLAŽNIM USLOVIMA IZ PIKNIDA CURE SPORE KOJE VRŠE INFEKCIJU MLADOG ZELENOG TKIVA.



SLIKA 4. SIMPTOMI CRNE PEGAVOSTI VINOVE LOZE NA LASTARU



SLIKA 5. PIKNIDI CRNE PEGAVOSTI NA KORI LASTARA

## **PREPORUKA**

U ZASADIMA GDE SU REGISTROVANI SIMPTOMI OVOG PATOGENA NEOPHODNO JE IZVRŠITI PREVENTIVNI TRETMAN PRIMENOM NEKOG OD SLEDEĆEG FUNGICIDA:

<b>PREPARAT</b>	<b>AKTIVNA MATERIJA</b>	<b>KONCENTRACIJA</b>
FOLPAN 50-WP	FOLPET	0,2%
MANKOGAL-80	MANKOZEB	0,2-0,25%

TRETMAN IZVRŠITI PRE NAJAVLJENIH PADAVINA ZA NEDELJU.