

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I DRAGI GLEDAOCI DOBRO DOŠLI U „ZELENU PROGNOZU“

DANAS VAS INFORMIŠEMO O PRISUSTVU BRAON MRAMORASTE STENICE U ZASADIMA LESKE I POTREBI SPROVOĐENJA MERA ZAŠTITE

.....

FAZE LESKE

NA PODRUČJU VOJVODINE ZASADI LESKE SE NALAZE U RAZLIČITIM FAZAMA RAZVOJA PLODA.



SLIKA 1. FAZA RAZVOJA LESKE

BRAON MRAMORASTA STENICA JE POREKLOM IZ ISTOČNE AZIJE. U EVROPI, PRVI PUT JE UOČENA 2007. GODINE, A U NAŠOJ ZEMLJI 2015. GODINE. OD REGISTROVANJA PRVE POJAVE OVE INVAZIVNE STENICE NA PODRUČJU SRBIJE PA DO DANAS, DOŠLO JE DO ZNAČAJNOG POVEĆANJA NJENE BROJNOSTI TE IMA VELIKI POTENCIJAL DA POSTANE EKONOMSKI ZNAČAJNA ŠTETOČINA VELIKOG BROJA GAJENIH BILJAKA KOD NAS.



SLIKA 2. BRAON MRAMORASTA STENICA NA RAZLIČITIM BILJNIM KULTURAMA

OVA ŠTETOČINA JE IZRAZITI POLIFAG, DO SADA JE REGISTROVANA NA PREKO 300 BILJNIH VRSTA MEĐU KOJIMA JE VELIKI BROJ POLJOPRIVREDNIH KULTURA. U NAŠOJ ZEMLJI, ZA SADA, OVA VRSTA JE REGISTROVANA U USEVIMA SOJE, KUKURUZA, PARADAJZA, PAPRIKE KAO I U ZASADIMA JABUKA, KRUŠAKA, BRESAKA, TREŠANJA, VIŠANJA, ORAHA, **LESKE**, MALINE I VINOVE LOZE.

U ZASADIMA LESKE OVA STENICA UZROKUJE ŠTETE SISANJEM SOKOVA IZ OMOTAČA, LJUSKE I JEZGRA PLODA. OŠTEĆENA JEZGRA BIVAJU SMEŽURANA, PLUTASTA I NEPRAVILNOG OBLIKA SA JASNO VIDLJIVIM UBODNIM MESTIMA OKO KOJIH SE ŠIRE NEKROTIČNE POVRŠINE, ŠTO ZNAČAJNO SMANJUJE KVALITET I TRŽIŠNU VREDNOST PLODA LESKE. PORED OVIH DIREKTNIH ŠTETA KOJA NASTAJU USLED ISHRANE, UBODNA MESTA PREDSTAVLJAJU ULAZNE OTVORE ZA POJAVU I RAZVOJ RAZLIČITIH PATOGENA PROUZROKOVAČA TRULEŽI PLODA.

VIZUELNIM PREGLEDOM ZASADA LESKE, REGISTROVANO JE PRISUSTVO SVIH RAZVOJNIH STADIJUMA OVE ŠTETOČINE.



SLIKA 3. ODRASLA JEDINKA BRAON MRAMORASTE STENICE



SLIKA 4. ODRASLA JEDINKA I LARVA BRAON MRAMORASTE STENICE



SLIKA 5. LARVE PRVOG RAZVOJNOG STUPNJA BRAON MRAMORASTE STENICE



6. LARVE BRAON MRAMORASTE STENICE

U GLAVNIM PROIZVODNIM REGIONIMA GAJENJA LESKE, POPUT ITALIJE, TURSKE I GRUZIJE, BRAON MRAMORASTA STENICA UVELIKO PREDSTAVLJA VEOMA ZNAČAJNU ŠTETOČINU OVE JEZGRASTE VOĆNE VRSTE, REDUKUJUĆU KVANTITET I KVALITET PROIZVODNJE, ŠTO UPUĆUJE NA OPREZ NA NJENO PRISUSTVO U PROZVODNJI LESKE I U NAŠOJ ZEMLJI.

PROIZVOĐAČIMA SE PREPORUČUJU PREGLEDI ZASADA LESKE NA PRISUSTVO POMENUTE ŠTETOČINE. UKOLIKO SE UOČI NJENO PRISUSTVO, SA CILJEM SPREČAVANJA NASTANKA POMENUTIH ŠTETA NA PLODOVIMA, PREPORUČUJE SE PRIMENA HEMIJSKIH MERA ZAŠTITE.

U NAŠOJ ZEMLJI NEMA REGISTROVANIH INSEKTICIDA ZA SUZBIJANJE OVE STENICE. PREPARATI IZ GRUPE PIRETROIDA POKAZALI SU DOBRU EFIKASNOST. U ZASADIMA LESKE

REGISTROVANI SU SLEDEĆI INSEKTICIDI IZ GRUPE PIRETROIDA KOJI SE MOGU KORISTITI U CILJU SUZBIJANJA BRAON MRAMORASTE STENICE:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA	KARENCA
KARATE ZEON, KOZAK	LAMBDA-CIHALOTRIN	0,2 L/HA	7 DANA
POLUX	DELTAMETRIN	0,05%	30 DANA

PRILIKOM PREGLEDA ZASADA TREBA OBRATITI PAŽNJU NA IVIČNE DELOVE PARCELE, JER OVA STENICA IMA SPOSOBNOST DA VRLO BRZO GRUPNO MIGRIRA IZ JEDNOG ZASADA U DRUGI, ŠTO NA NAPADNUTIM PARCELAMA VRLO ČESTO IZAZIVA TZV. IVIČNI EFEKAT NJENOG PRISUSTVA I ŠTETNOSTI (ŠTETE NA IVICAMA ZASADA GDE SE STENICE GRUPIŠU SU ZNATNO IZRAŽENIJE).

.....

POŠTOVANI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI I POŠTOVANI GLEDAOCI, DETALJNIJE INFORMACIJE O POJAVI ŠTETNIH ORGANIZAMA I MERAMA KONTROLE MOŽETE POGLEDATI NA SAJTU PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE WWW.PISVOJVODINA.COM