

BILJKA DOMAĆIN: KAJSIJA, BRESKVA, NEKTARINA

TEMA: ZAŠTITA KOŠTIČAVOG VOĆA OD PROUZROKOVAČA BOLESTI

NA PODRUČJU VOJVODINE ZASADI KAJSIJA SE U ZAVISNOSTI OD SORTIMENTA, LOKALITETA I EKSPOZICIJE TERENA NALAZE U FAZAMA OD PRED CVETANJE DO PUNOG CVETANJA. ZASADI BRESAKA I NEKTARINA SE NALAZE U FAZI OD KRAJA BUBRENJA PUPOLJAKA DO POČETKA CVETANJA.

SVE OVE FAZE SU OSETLJIVE SA ASPEKTA ZAŠTITE OD PROUZROKOVAČA EKONOMSKI VEOMA ZNAČAJNIH OBOLJENJA KOŠTIČAVOG VOĆA.

U ZASADIMA BRESAKA I NEKTARINA KOJI SU U FAZI KRAJA BUBRENJA PUPOLJAKA I POJAVE PRVIH LISTIĆA, SA NAJAVLJENIM PADAVINAMA POSTOJI RIZIK OD OSTVARENJA INFEKCIJA PROUZROKOVAČEM KOVRDŽAVOSTI LISTA BRESKVE.

PREPORUKA: IAKO JE PORED PADAVINA NAJAVLJEN PAD TEMPERATURA, PREPORUKA JE DA SE PRE PADAVINA SPROVEDE PREVENTIVNI TRETMAN JER OVAJ PATOGEN OSTVARUJE INFEKCIJE NA TEMPERATURAMA OD 5°C DO 16°C. REGISTROVANI FUNGICIDI ZA SUZBIJANJE PROUZROKOVAČA KOVRDŽAVOSTI LISTA SU:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	KONCENTRACIJA
SYLLIT 400 SC	DODIN	0,15-0,25%
AGROCIRAM	CIRAM	0,25-0,35%
DIZIRAM 76 WG	CIRAM	0,3%
DELAN 700 WG, GALILEO, FIESTA	DITIANON	0,075%

U SVIM ZASADIMA KOŠTIČAVOG VOĆA GDE JE U TOKU CVETANJE, SA PADAVINAMA POSTOJI RIZIK OD ZARAZE CVETA PROUZROKOVAČEM SUŠENJA CVETOVA I GRANA KOŠTIČAVOG VOĆA. OVO OBOLJENJE JE POZNATO JOŠ POD NAZIVOM MONILIOZA KOŠTIČAVOG VOĆA.

INFEKCIJA SE OSTVARUJE PREKO ŽIGA TUČKA U PRISUSTVU PADAVINA ILI VISOKE VLAŽNOSTI NA TEMPERATURAMA OD 5°C DO 25°C.

PREPORUKA: UKOLIKO JE VEĆ OSTVARENA INFEKCIJA NIJE MOGUĆE SPREČITI DALJI RAZVOJ BOLESTI, TE JE NEOPHODNO SPOROVESTI PREVENTIVNE MERE ZAŠTITE. U ZASADIMA KAJSIJA SE PREPORUČUJE PRIMENA NEKOG OD REGISTROVANIH FUNGICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA / KONCENTRACIJA
ATLAS	CIPRODINIL+FLUDIOKSONIL	0,8-1 KG/HA
SIGNUM	BOSKALID+PIRAKLOSTROBIN	0,562-0,75 KG/HA

U ZASADIMA BRESAKA I NEKTARINA KOJE SU FAZAMA CVETANJA, PREPORUČUJE SE PRIMENA NEKOG OD REGISTROVANIH FUNGICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	DOZA / KONCENTRACIJA
CIPRODEX	CIPRODINIL	0,05%
NEON	CIPRODINIL	0,5 L/HA
CHORUS 50 WG	CIPRODINIL	0,5 KG/HA
DIVERTO	CIPRODINIL	0,5 L/HA
DUOFEN	TIOFANAT-METIL	1,5 L/HA
FUNOMIL	TIOFANAT-METIL	0,07%
SIGNUM	BOSKALID+PIRAKLOSTROBIN	0,562-0,75 KG/HA

PRILIKOM PRIMENE PESTICIDA TREBA PREDUZETI SVE MERE ZAŠTITE PČELA I DRUGIH OPRAŠIVAČA. SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA TREBA KORISTITI PRAVILNO, U SKLADU SA UPUTSTVOM NAVEDENIM NA ETIKETI I U SKLADU SA DOBROM POLJOPRIVREDNOM PRAKSOM.

U PERIODU CVETANJA VOĆA ZABRANJENA JE PRIMENA INSEKTICIDA!



SLIKA 1. FAZA RAZVOJA BRESKVE, KRAJ BUBRENJA PUPOLJAKA I POJAVA PRVIH LISTIĆA



SLIKA 2. SIMPTOM KOVRDŽAVOSTI NA LISTU NEKTARINE



SLIKA 5. SIMPTOM KOVRDŽAVOSTI NA PLODU BRESKVE



SLIKA 3. FAZA RAZVOJA KAJSIJE, BELI BALON



SLIKA 4. FAZA RAZVOJA NEKTARINE, POČETAK CVETANJA



SLIKA 5. FAZA RAZVOJA KAJSIJE, PUNO CVETANJE



SLIKA 6. SIMPTOM SUŠENJA CVETA I MLADARA NA NEKTARINI



SLIKA 7. SIMPTOM SUŠENJA CVETA I GRANČICE NA KAJSIJ



SLIKA 8. PČELA NA CVETU NEKTARINE