

Zelena prognoza za 14.5.2018. - O stanju u zasadima jabuka

FAZE JABUKA

NA PODRUČJU VOJVODINE JABUKE SE NALAZE U FAZI RAZVOJA PLODA, PREČNIK PLODA JE DOSTIGAO VELIČINU OD 20 DO 40 MILIMETARA.



SLIKA 1. FAZA RAZVOJA PLODA, SORTA AJDARED

JABUKIN SMOTAVAC (*Carpocapsa pomonella*)

JABUKIN SMOTAVAC JE NAJZNAČAJNIJA ŠTETOČINA JABUKE. U NAŠIM PROIZVODNIM USLOVIMA RAZVIJA DVE DO TRI GENERACIJE GODIŠNJE.

ŠTETE PRIČINJAVAJU LARVE KOJE SE UBUŠUJU U PLODOVE I ISHRANJUJU MESOM PLODA I SEMENKAMA. NAPADNUTI PLODOVI PREVREMENO OTPADAJU I GUBE TRŽIŠNU VREDNOST.

NA LISTOVIMA SE REGISTRUJU POLOŽENA JAJA RAZLIČITIH STADIJUMA RAZVOJA. PRISUTNA SU SVEŽE POLOŽENA-BELA JAJA, JAJA U RAZVOJU-SA CRVENIM OREOLOM I JAJA NEPOSREDNO PRED PILJENJE – JAJA SA CRNOM GLAVOM.

NA PODRUČJU VOJVODINE TRENUTNO JE U TOKU INTENZIVNO PILJENJE LARVI PRVE GENERACIJE JABUKINOG SMOTAVACA.



SLIKA 2. SVEŽE POLOŽENO JAJE JABUKINOG SMOTAVCA



SLIKA 3. JAJA JABUKINOG SMOTAVCA SA CRVENIM OREOLOM

PREPORUKA

U CILJU SUZBIJANJA LARVI PREPORUČUJE SE PRIMENA INSEKTICIDA:

PREPARAT	AKTIVNA MATERIJA	KONCENTRACIJA
KONZUL, NURELLE-D, DESPOT	HLORPIFOS+CIPERMETRIN	0,075-0,1%

ČAĐAVA PEGAVOST LISTOVA I KRSTAVOST PLODOVA JABUKE (*Venturia inaequalis*)

ČAĐAVA PEGAVOST LISTOVA I KRSTAVOST PLODOVA JE NAJDESTRUKTIVNIJE OBOLJENJE U ZASADIMA JABUKA. STRATEGIJA ZAŠTITE JABUKA OD OVOG PATOGENA ZASNIVA SE NA SPREČAVANJU PRIMARNIH INFEKCIJA. NA CELOM PODRUČJU VOJVODINE PERIOD PRIMARNIH INFEKCIJA JE JOŠ UVEK U TOKU, ODNOSNO U ZASADIMA JABUKA JOŠ UVEK SE REGISTRUJE PRISUSTVO ASKOSPORA U OPALOM LIŠĆU.

U TABELI SE MOŽE VIDETI PROCENAT ISPRAŽNJENOSTI PSEUDOTECIJA PO REGIONIMA:

REGION	ISPRAŽNJENOST PSEUDOTECIJA (%)
NOVI SAD	62
RUMA	52
SREMSKA MITROVICA	43
ZRENJANIN	39
VRŠAC	28
KIKINDA	27
SENTA	20

SA SVAKIM NAREDNIM PADAVINAMA POSTOJI RIZIK OD OSLOBAĐANJA ASKOSPORA I OSTVARENJA INFEKCIJA.



SLIKA 4. SIMPTOMI ČAĐAVE PEGAVOSTI NA LISTU JABUKE (SLIKA IZ PREDHODNE VEGETACIJE)

PREPORUKA

SISTEM PROGNOZNO IZVEŠTAJNE SLUŽBE ZAŠTITE BILJA VOJVODINE UVEK PREPORUČUJE PREVENTIVNU ZAŠTITU KAO NAJKVALITETNIJU I NAJSIGURNIJU I U SMISLU ZAŠTITE JABUKA I U SMISLU ODLAGANJA I SPREČAVANJA REZISTENCIJE PATOGENA.

UKOLIKO SU MERE ZAŠTITE SPROVEDENE KRAJEM PROŠLE NEDELJE, PRE REALIZOVANIH PADAVINA, MOŽE SE RAČUNATI DA SU JABUKE JOŠ UVEK POD ZAŠTITOM.

MEĐUTIM, UKOLIKO JE IZOSTALA PREVENTIVNA ZAŠTITA PRE PADAVINA, NEOPHODNA JE PRIMENA FUNGICIDA KOJI IMAJU POVRATNO DELOVANJE NA VEĆ OSTVARENE ZARAZE. ZBOG LOKALNOG KARAKTERA I RAZLIČITOG INTENZITETA PADAVINA U POSLEDNJIH NEKOLIKO DANA, NAJBOLJE JE OBRATITI SE NAJBLIŽEM REGIONALNOM CENTRU PIS-A KAKO BI SE NAPRAVIO NAJBOLJI IZBOR PREPARATA U ODNOSU NA REALIZOVANE USLOVE.